

Sachol, żel stomatologiczny, tuba 10 g



Nasza cena: 26,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10g
Producent	JELFA S.A. JELENIA GÓRA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CHOLINI SALICYLAS, CETALKONIUM

Opis produktu

Opis

Sachol, żel stomatologiczny, tuba 10 g

Sachol żel stomatologiczny to lek do miejscowego stosowania w jamie ustnej. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i odkażająco.

Postać

Żel do stosowania w jamie ustnej i na dziąsła

Wielkość opakowania

10 g

Opis produktu / Wskazania i działanie

Sachol żel stomatologiczny wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające. Efekty te są wynikiem aktywności poszczególnych składników leku:

- salicylan choliny – działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo,
- chlorek cetalkoniowy – wzmacnia przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie żelu,
- parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu – wykazują działanie odkażające.

Lek Sachol żel stomatologiczny jest wskazany do miejscowego stosowania:

- w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej,
- w nadżerkach i owrzodzeniach jamy ustnej,
- w stanach zapalnych dziąseł,
- w chorobach przyzębia.

Co to jest Sachol żel – skład i postać

Skład

Substancjami czynnymi leku są cholina salicylan i cetalkoniowy chlorek. 1 g żelu zawiera: 87,1 mg choliny salicylanu (Cholinisalicylas) i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku (Cetalkoniichloridum) oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, a także pozostałe substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, glicerol, olejek eteryczny anyżu gwiaździstego, etanol 96%, woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna

przezroczysty, bezbarwny, jednolity żel o zapachu olejku anyżowego.

Dawkowanie – jak stosować żel Sachol?

Żel stomatologiczny Sachol należy stosować od 2 do 3 razy na dobę.

Sposób aplikacji: niewielką ilość żelu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsce i lekko wcierać przez około 2 minuty. Po zastosowaniu preparatu przez około pół godziny nie powinno się pić oraz spożywać pokarmów.. Bezpośrednio po aplikacji żel utrzymuje się na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej przez kilka minut.

Lek Sachol należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, według zaleceń producenta. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Sachol żel stomatologiczny przeciwwskazania – kiedy nie stosować?

Jeśli pacjent jest uczulony na cholinę salicylan, cetalkoniowy chlorek, inne salicylany lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed pierwszym zastosowaniem leku Sachol warto skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

W miejscu zastosowania leku może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie

Sachol – czy można stosować u dzieci?

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Sachol żel stomatologiczny a inne leki

Podczas miejscowego stosowania produktu leczniczego zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie istnieje ryzyko wystąpienia interakcji. Tylko w przypadku znacznego przedawkowania i pojawienia się objawów ogólnego działania choliny salicylanu należy uwzględnić, że działa on synergicznie z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi.

Lek Sachol żel stomatologiczny w ciąży i podczas karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono badań określających czas i stopień wchłonięcia choliny salicylanu do organizmu po miejscowym stosowaniu żelu na błonę śluzową jamy ustnej. Nie mniej jednak pochodne kwasu salicylowego są przeciwwskazane w III trymestrze ciąży.

Pochodne kwasu salicylowego są wydzielane z mlekiem matki i nie zaleca się ich stosowania w okresie karmienia piersią.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sachol żel stomatologiczny nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Sachol żel stomatologiczny może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.

Przedawkowanie

Teoretycznie nie jest możliwe przedawkowanie produktu leczniczego. Jeżeli to jednak nastąpi, pacjent powinien przepłukać jamę ustną obfitą ilością wody i ewentualnie wywołać wymioty.

W przypadku nadwrażliwości na salicylany, po przedawkowaniu żelu i wchłonięciu do organizmu znaczących ilości choliny salicylanu mogą wystąpić objawy ogólnego działania salicylanów jak: pocenie się, szum w uszach, nudności, wymioty, zawroty głowy, zmiany skórne (rumień lub pokrzywka).

Przechowywanie / Okres ważności

- Sachol żel stomatologiczny należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Leku nie wolno zamrażać.
- Produkt leczniczy musi być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Termin ważności leku wynosi 2 lata.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tubki wynosi 6 miesięcy.
- Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny

Bausch + Lomb Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Informacji o produkcji udziela

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
Aleja Szucha 13/15
00-580 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.