

Sapoven T, 48 kapsułek



Nasza cena: 21,88 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*48
Postać	KAPS.
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TROXERUTINUM, AESCULUS HIPPOCASTANUM

Opis produktu

Opis

Sapoven T, 48 kapsułek

Lek Sapoven T, kapsułki miękkie, zawiera trokserutynę w połączeniu z ekstraktem z nasion kasztanowca (zawierającym 20 % escyny).

Dawkowanie

Dorośli: 3 razy dziennie po 1 kapsułce podczas posiłku. Zalecany okres stosowania wynosi 3 do 4 tygodni.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancje czynne:

Troxerutinum (trokserutyna) zawierająca nie mniej niż 80 % trihydroksyetylorutyny - 200 mg.

Hippocastani Semen extractum siccum (suchy wyciąg z nasion kasztanowca DER 5-7:1) - 105,3 mg (co odpowiada 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę ekstrahent: etanol 80% (v/v)

- substancje pomocnicze:

olej sojowy oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy, olej palmowy, wosk żółty, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek E 171, żelaza tlenek brązowy E 172, żelaza tlenek żółty E 172.

Działanie

Lek wpływa na napięcie naczyń żylnych, zmniejsza ich przepuszczalność, usprawnia krążenie żyłne, zapobiega zastojom żylnym, działa przeciwobrzękowo i przeciwwysiękowo.

Wskazania

Lek stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnych kończyn dolnych np. przy uczuciu bólu, obrzęku nóg, nocnych kurczach

tydek, uczuciu ciężkości nóg.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Sapoven T jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Możliwe działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka, które ustępuje, jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłków, a także napadowe zaczerwienienie twarzy, bóle głowy i wysypka.

Uwagi

- Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych.
- Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką lekarską nie zaleca się samodzielnego stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Lek zawiera oczyszczony olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.
- Z uwagi na zawartość escyny zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sapoven T jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi. Escyna może zwiększać ryzyko krwawienia przy jednoczesnym stosowaniu z pochodnymi kumaryny, NLPZ, heparyną.
- Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.