

## Sapoven T, żel 30g



Nasza cena: 15,27 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	30 g
Postać	ZEL
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TROXERUTINUM, AESCULUS HIPPOCASTANUM

### Opis produktu

#### Opis

Lek Sapoven T, żel, zawiera trokserutynę oraz nieistotny dla działania farmakodynamicznego dodatek substancji roślinnej - zagęszczony wyciąg z nasion kasztanowca.

#### Dawkowanie - Sapoven T, żel 30g

Lek Sapoven T stosuje się miejscowo na skórę.  
Dorośli: żel wcierać 2-3 razy na dobę w zmienione chorobowo miejsce.

#### Składniki - Sapoven T, żel 30g

1g żelu zawiera:

- substancje czynne

20mg trokserutyny i 100mg zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca *Aesculus hippocastanum* L. (*Hippocastani semen extractum*), zawierającego 10mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (DER 4:1, ekstrahent:etanol 80%),

- substancje pomocnicze

glikol propylenowy, trometamol, karbomer, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cytrynowy, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, woda oczyszczona.

#### Działania

Działa przeciwobrzękowo, uszczelniającą i tonizującą na żyły, poprawia stan śródbłonek naczyń włosowatych zmniejszając ich przepuszczalność i łamliwość.

#### Wskazania - Sapoven T, żel 30g

Lek stosuje się w przewlekłej niewydolności żyłnej, w tym:  
w leczenie zaburzeń krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (z objawami obrzęków, uczuciem świądu),  
w dolegliwościach związanych z żylakami i w stanach przedżylakowych,  
pomocniczo w obrzękach pourazowych oraz po zabiegach chirurgicznych.

### Przeciwwskazania - Sapoven T, żel 30g

Nie należy stosować leku Sapoven T w przypadku otwartych, rozległych ran i uszkodzonej skóry oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

### Przeciwwskazania - Sapoven T, żel 30g

Podczas stosowania może wystąpić przemijające uczucie ciepła i podrażnienie skóry, u osób nadwrażliwych może wystąpić pokrzywka.

### Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Lek jest uważany za bezpieczny i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego lek może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesu i propylu parahydroksybenzoesu lek może powodować reakcje alergiczne.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**