

## Saridon, 20 tabletek

Nasza cena: 17,28 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, PROPYPHENAZONUM, COFFEINU

### Opis produktu

#### Opis

### Saridon, 20 tabletek

Produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym do stosowania w bólu różnego pochodzenia (ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy) oraz w gorączce związanej z przeziębieniem.

### Skład

Substancjami czynnymi są: paracetamol (*Paracetamolum*), propyfenazon (*Propyphenazonum*), kofeina (*Coffeinum*).

1 tabletkę zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, esma-spreng, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, gorączka dłużej niż 3 dni lub wystąpią dodatkowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

**Dorośli:** 1-2 tabletki.

**Młodzież w wieku 12-16 lat:** 1 tabletką.

Jeśli istnieje konieczność, dawkę można powtórzyć do trzech razy na dobę.

## Działanie

Saridon wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

## Wskazania

ból różnego pochodzenia (ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny),  
ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą.

## Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Saridon:

w przypadku uczulenia na substancje czynne - propyfenazon, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,  
w przypadku nadwrażliwości na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, aminofenazon, metamizol),  
w przypadku uczulenia na febylbutazon, kwas acetylosalicylowy,  
jeśli u pacjenta występują: wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, ostra porfiria wątrobowa,  
u osób poniżej 12 lat.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza,  
nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha,  
niewydolność wątroby, zapalenie wątroby,  
zawroty głowy, senność,  
uszkodzenie nerek,  
skurcz oskrzeli, astma,  
wysypka, świąd, obrzęk alergiczny i naczynioruchowy, rumień.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie paracetamolu może prowadzić do niewydolności wątroby, podwyższenia stężenia aminotransferazy alaninowej ALT, a także do uszkodzenia nerek.

Osoby z niewydolnością nerek powinny mieć dostosowaną dawkę leku przez lekarza.

W przypadku wystąpienia wysypki, zaczerwienienia czy pęcherzy na skórze, stosowanie leku należy przerwać.

Leku nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może wiązać się z wystąpieniem przewlekłego bólu głowy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

## Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Saridon może wchodzić w interakcje z:

ryfamipicyną,  
fenobarbitem, fenytoiną, karbamazepiną,

warfaryną, pochodnymi kumaryn,  
NLPZ,  
lekami przeciwhistaminowymi,  
pseudoefedryną,  
tyroksyną,  
teofiliną,  
cymetydyną,  
doustnymi lekami antykoncepcyjnymi,  
metoklopramidem.

### Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Leku nie należy łączyć z alkoholem.

### Ciąża i karmienie piersią

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

### Wpływ na płodność

Paracetamol może zaburzać płodność. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu stosowania.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

### Podmiot odpowiedzialny

BAYER SP. Z O.O.  
Aleje Jerozolimskie 158  
Warszawa

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**