

Saridon tabletki x 20 (Import równoległy)



Nasza cena: 17,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, PROPYPHENAZONUM, COFFEINU

Opis produktu

Opis

Saridon ma zastosowanie podczas bóli różnego pochodzenia: głowy, zębów, nerwobólach, bólach reumatoidalnych itp. grypa, przeziębienia oraz bolesne miesiączkowanie.

Zawarty w leku **propyfenazon** działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie; szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 1 godzinie, jest metabolizowany w wątrobie, częściowo wydalany z moczem w postaci nie zmienionej. Przenika przez łożysko i barierę krew-mózg.

Drugi składnik preparatu - **paracetamol** działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 30-60 min., przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wywołuje tam indukcję enzymów mikrosomalnych, wydalany z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi

Dawkowanie:

Dorośli: 1/2 – 1 tabletki 3 razy dziennie

dzieci powyżej 12 roku życia: 1/2 – 1 tabletki 3 razy dziennie

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej dawki do spożycia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.