

Scorbolamid, 20 tabletek drażowanych



Nasza cena: 13,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	DRAŻ.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SALICYLAMIDUM, RUTOSIDUM, ACIDUM ASCORBI

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w gorączce i bólach związane z przeziębieniem lub grypą, bólach głowy, nerwobólach.

Dawkowanie - Scorbolamid, drażetki, 20 szt

Doustnie, zwykle 1-2 tabletki drażowane 3 razy na dobę. Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku albo popić szklanką wody lub mleka.

Składniki - Scorbolamid, drażetki, 20 szt

Substancjami czynnymi leku są salicylamid, kwas askorbowy i rutozyd.

1 tabletki drażowana zawiera: 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu.

Inne składniki leku to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiące rdzeń tabletki drażowanej) oraz sacharoza, talk guma arabska, żółcień chinolinowa (E-104), wosk Carnauba i woda oczyszczona (stanowiące otoczkę).

Działania

- Salicylamid - działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
- Rutozyd - wzmacnia naczynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem i dlatego witamina C dłużej działa.
- Kwas askorbowy (witamina C) – uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.

Przeciwwskazania - Scorbolamid, drażetki, 20 szt

Nie stosować leku Scorbolamid:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na salicylamid, którykolwiek z pozostałych składników lub na inne NLPZ,
- jeśli u pacjenta występuje astma z polipami nosa,
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy lub stany zapalne przewodu pokarmowego,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej,

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi,
- jeśli u pacjenta występuje genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- jeśli u pacjenta występuje kamica nerkowa,
- jeśli u pacjenta występuje hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna, nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu,
- w ciąży, w okresie karmienia piersią.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przeciwwskazania - Scorbolamid, drażetki, 20 szt

Najczęstsze działania niepożądane występują ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Zaburzenia żołądka i jelit:

nudności, wymioty, skurcze w obrębie jamy brzusznej, uczucie palenia za mostkiem, brak łaknienia, biegunka, podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, suchość w ustach.

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy, senność, bóle głowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

zaczerwienienie twarzy, wysypka, nadmierna potliwość.

Uwagi

Stosując lek Scorbolamid należy zachować szczególną ostrożność:

- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa,

- jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek,

-u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej i krwawieniach z przewodu pokarmowego.

Nie należy stosować leku Scorbolamid równocześnie z lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy, ani innymi lekami z grupy NLPZ. Podczas równoczesnego stosowania z kortykosteroidami salicylamid może nasilać objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego.

Ciąża: lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią: Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: brak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w czasie stosowania leku Scorbolamid.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.