

Sebidin Plus 16 pastylek



Nasza cena: 10,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*16
Postać	Tabletki
Producent	Glaxo Smith Kline Pharm.s.a.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Sebidin Plus jest lekiem o skojarzonym działaniu chlorheksydyny i witaminy C.

Dawkowanie - Sebidin Plus 16 pastylek

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat - ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin). Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.

Składniki - Sebidin Plus 16 pastylek

1 tabletkę zawiera substancje czynne:

- chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg
- kwas askorbowy 75 mg

oraz substancje pomocnicze: glicerolu distearynian, aspartam, ksylitol, mannitol, magnezu stearynian, makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, żółcień chinolinowa E104, sorbitol.

Preparat nie zawiera cukru.

Działania

Chlorheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakterioobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków *Candida albicans*.

witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na kwas askorbowy występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i krtani.

Zapobiega i leczy zapalenia dziąseł oraz choroby przeziębienia, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej o charakterze nieżytowym. Odkąsza jamę ustną przed i po zabiegach chirurgicznych.

Wskazania - Sebidin Plus 16 pastylek

Sebidin Plus jest wskazany w:

- zapaleniu błony śluzowej gardła,
- zapobieganiu i leczeniu zapaleń dziąseł oraz chorób przyzębia,

- zapaleniach błony śluzowej jamy ustnej o charakterze nieżytowym,
- aftach przewlekłe nawracających, pleśniawkach, nadżerkach i odleżynach będących następstwem stosowania przez pacjentów źle dopasowanych uzupełnień protetycznych,
- odkażaniu jamy ustnej przed i po zabiegach chirurgicznych.

Przeciwwskazania - Sebidin Plus 16 pastylek

Nadwrażliwość na chlorheksydynę lub inne składniki leku.

Przeciwwskazania - Sebidin Plus 16 pastylek

Niekiedy mogą wystąpić reakcje alergiczne, podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz podrażnienie żołądka i biegunka.

Uwagi

- Stosowanie leku może zaburzać odczuwanie smaku, które zwykle ustępuje po 4 godzinach od zastosowania. Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić zmiany odcienia barwy zębów oraz grzbietu języka, które ustępują samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.
- Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
- Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.
- Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią.
- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.