

## Senefol, tabletki, 90 szt.



Nasza cena: 28,78 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*90
Postać	Tabletki
Producent	LABOFARM STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CASSIA SENNA

### Opis produktu

#### Opis

Senefol jest to preparat w postaci tabletek o działaniu przeczyszczającym.

#### Dawkowanie - Senefol, tabletki, 90 szt.

Dzieci powyżej 12 lat, dorośli: 2-3 tabletki przed snem. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość osobniczą dawkowanie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki (1 tabl.), którą należy w razie potrzeby zwiększyć do ustalenia dawki skutecznej. W przypadku braku efektu przeczyszczającego następną dawkę preparatu przyjąć po upływie 12 godzin. Przyjmowanie leku do 2-3 razy w tygodniu jest zwykle wystarczające do uzyskania efektu terapeutycznego.

#### Składniki - Senefol, tabletki, 90 szt.

Sennae folium cum fructus (liść i owoc senesu) - 300 mg.

Składniki - Senefol, tabletki, 90 szt. pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemu dwutlenek koloidalny (E551).

Jedna tabletki zawiera 7,5 mg antranoidów.

#### Działania

Związki czynne powstające z glikozydów antranoidowych zawartych w liściach i owocach senesu wpływają na perystaltykę jelita grubego, hamują wchłanianie wody, co powoduje zmiękczenie mas kałowych i ułatwia wypróżnienie. Efekt przeczyszczający występuje po okresie od 8 do 12 godzin.

#### Wskazania - Senefol, tabletki, 90 szt.

Senefol jest to preparat do stosowania w zaparciach.

### Przeciwwskazania - Senefol, tabletki, 90 szt.

Nie należy stosować leku w niedrożności i zwężeniu jelit, atonii, zapaleniu wyrostka robaczkowego, w zapalnych schorzeniach jelit, bólach brzucha niewiadomego pochodzenia, w stanie odwodnienia połączonym z utratą elektrolitów.

### Przeciwwskazania - Senefol, tabletki, 90 szt.

U osób nadwrażliwych na składniki preparatu mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, m.in. świąd, pokrzywka, wysypka. Mogą wystąpić dolegliwości skurczowe i bólowe brzucha. Należy wówczas zredukować stosowane dawki. Długotrwałe przyjmowanie leku może spowodować ciemne zabarwienie śluzówki okrężnicy (pseudomelanosis coli), które zwykle ustępuje po zakończeniu przyjmowania preparatu. Możliwość zmiany zabarwienia moczu metabolitami (na kolor różowy lub czerwono-różowy, zależnie od pH), nie ma znaczenia klinicznego.

### Uwagi

Przyjmowanie środków przeczyszczających w okresie dłuższym niż zalecany, może zaburzyć funkcjonowanie jelit oraz powodować uzależnienie.

U pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek istnieje ryzyko zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie zaleca się stosowania preparatu podczas ciąży i karmienia piersią.

Przewlekłe nadużywanie preparatu może prowadzić do hipokaliemii, wówczas możliwe jest nasilenie działania równocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych, leków antyarytmicznych, leków wydłużających odcinek QT oraz leków przywracających rytm zatokowy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**