

SEPTOGARD smak miodowo-pomarańczowy 3 mg, 20 pastylek do ssania



Nasza cena: 10,30 zł

Opis słownikowy

Dawka	3 MG
Opakowanie	*20
Postać	PASTYL.
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

SEPTOGARD smak miodowo-pomarańczowy 3 mg, 20 pastylek do ssania

Septogard pastylki do ssania wskazane są w miejscowym leczeniu objawowym ostrego bólu gardła u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Smak miodowo-pomarańczowy.

Właściwości

Lek zawiera jako substancję czynną benzydaminę chlorowoderek. Zmniejsza ona dolegliwości związane z ostrym bólem gardła. Lek może być stosowany do objawowego leczenia infekcji górnych dróg oddechowych, które charakteryzują się symptomami takie jak ból, trudności w przełykaniu czy suchość w jamie ustnej i gardle.

Skład

Substancją czynną leku jest: benzydaminę chlorowoderek.

Jedna pastylka twarda zawiera: 3 mg benzydaminę chlorowodoru (co odpowiada 2,68 mg benzydaminę).

Pozostałe składniki leku to: izomalt (E 953), kwas cytrynowy jednowodny, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), olejek eteryczny miętowy, czerwień koszenilowa (E 124), aromat pomarańczowy, aromat miodowy (zawiera glikol propylenowy (E 1520)).

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać 1 pastylkę 3 razy na dobę w celu złagodzenia bólu gardła.

Ważne informacje

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat lek należy podawać pod nadzorem osoby dorosłej.

Lek Septogard należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Uczulenie na benzydaminę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Pastyłki nie są wskazane do stosowania również kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią.

Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Leku Septogard smak cytrynowy nie należy stosować dłużej niż 7 dni.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej lub pojawi się gorączka, silny ból gardła lub inne objawy, należy zwrócić się

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.