

Septolete Cherry, 18 tabletek



Nasza cena: 15,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*18
Postać	Tabletki
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CETYLPYRIDINIUM

Opis produktu

Opis

Lek **Septolete Cherry** działa miejscowo odkażająco.

Dawkowanie:

Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi do 8 pastylek na dobę. Należy ssać pastylkę co 2 do 3 godzin. U dzieci w wieku powyżej 4 lat zaleca się do 4 pastylek na dobę, u dzieci w wieku 10-12 lat do 6 pastylek na dobę. Pastylki należy ssać co 3 do 4 godzin. Nie należy zażywać leku bezpośrednio przed lub w czasie jedzenia.

Składniki:

Substancją czynną leku jest chlorek cetylopirydyniowy.
1 pastylka zawiera 1,2 mg chlorku cetylopirydyniowego.

Pozostałe składniki leku Septolete Cherry to: maltitol płynny (sucha masa), maltitol, mannitol, lewomentol, olejek cytrynowy, aromat jabłkowy, barwnik naturalny żółty (Kurkuma, E100), barwnik naturalny zielony (kompleksy miedziowe chlorofilu i chlorofilin, E141), glicerol, olej rycynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, tytanu ditlenek (E171), powidon, Capol 600.

Działania:

Lek Septolete Cherry działa miejscowo odkażająco. Zawiera środek odkażający – chlorek cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo, działa również na niektóre wirusy i grzyby. Pastylki odkażają jamę ustną i gardło i w ten sposób łagodzą stany zapalne jamy ustnej i gardła. Dzięki dobrej rozpuszczalności chlorek cetylopirydyniowy dobrze przenika również do trudno dostępnych miejsc błony śluzowej jamy ustnej i gardła i hamuje tam rozwój bakterii.

Wskazania:

Lek Septolete Cherry zaleca się w miejscowym leczeniu lekkich zakażeń jamy ustnej i gardła (zapalenie gardła, zapalenie krtani, początkowy okres zapalenia migdałków podniebiennych).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, biegunka. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak podrażnienie i wysypka.

Uwagi:

Nie zażywać w przypadku ran i nadżerek w jamie ustnej.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować preparat Septolete Apple tylko po konsultacji z lekarzem.

Pastyłki zawierają naturalny barwnik, dlatego w przypadku wystawienia na światło z czasem mogą blednąć.

Pastyłki zawierają alkohole wielowodorotlenowe (maltitol, mannitol), które w dużych dawkach mogą powodować biegunkę. Glicerol w dużych dawkach może powodować bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć pod uwagę, że każda pastylka zawiera około 1 g maltitolu.

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.