


Septolete, tabletki, 30 szt.



Nasza cena: 15,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w leczeniu objawowym w celu łagodzenia bólu i odkażania w : stanach zapalnych jamy ustnej, gardła i dziąseł, nieprzyjemnym zapachu z ust.

Dawkowanie - Septolete, tabletki, 30 szt.

1 pastylkę ssać co 2-3 godz. Maksymalnie 8 pastylek na dobę. Pastylek nie połykać, ssać do całkowitego rozpuszczenia.

Składniki - Septolete, tabletki, 30 szt.

1 pastylka twarda zawiera:

- substancje czynne: chlorek benzalkoniowy 1mg, Lewomentol 1,2mg, Olejek miętowy 1mg, Tymol 0.6mg, Olejek eukaliptusowy 0,6mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, parafina ciekła, gliceryna, olej rycynowy z pierwszego tłoczenia, sorbitol, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa (E104), syrop glukozowy, indygotyna (E132), tytanu dwutlenek (E171), Capol 600, powidon, Antifoam Aqueut 1510, sacharoza.

Działania

Lek Septolete pastylki twarde zawiera chlorek benzalkoniowy, który działa odkażająco i przez swoje działanie niszczy liczne rodzaje bakterii i niektóre grzyby. Mentol i olejek miętowy łagodzą pieczenie i ból przy połykaniu. Podobnie do chlorku benzalkoniowego działa tymol i dodatkowo nasila odkażające działanie leku. Olejek eukaliptusowy przyspiesza wykrztuszanie śluzu w górnych drogach oddechowych i w ten sposób ułatwia oddychanie. Lek Septolete pastylki twarde działa bezpośrednio na drobnoustroje wywołujące zakażenia, hamuje rozwój zakażenia i skutecznie łagodzi dolegliwości w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania - Septolete, tabletki, 30 szt.

Nie należy stosować leku Septolete pastylki twarde w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na chlorek benzalkoniowy, mentol, olejek

miętowy, olejek eukaliptusowy, tymol, lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazania - Septolete, tabletki, 30 szt.

U osób wrażliwych zażywanie większych dawek od zalecanych może powodować zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Wystąpić mogą również reakcje nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników (m.in. zwężenie oskrzeli, szczególnie u osób chorych na astmę).

Uwagi

Lek zawiera laktozę, sacharozę, syrop glukozowy, glukozę, sorbitol, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny stosować tego leku, gdyż brak wystarczających danych o bezpieczeństwie stosowania preparatu podczas ciąży i karmienia piersią.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.