

Setaloft 100 mg 30 tabletek

Nasza cena: 8,47 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	ACTAVIS ISLANDIA [IS]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	SERTRALINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania przez pacjentów, u których zostały stwierdzone:

- duże epizody depresyjne,
- zapobieganie nawrotom dużych epizodów depresyjnych,
- zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii,
- zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne,
- fobia społeczna,
- zaburzenie stresowe pourazowe.

Dawkowanie:

- lek Setaloft powinien być stosowany pod kontrolą lekarza i według jego zaleceń,
- dawka produktu ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta ze względu na rodzaj i nasilenie schorzeń, na podstawie przeprowadzonych badań,
- dawka leku powinna zaczynać się od najmniejszej dostępnej dawki, zazwyczaj stosuje się dawkę od 25 mg na dobę do 50 mg raz na dobę,

- dawka leku może być zwiększana stopniowo o 50 mg, w odstępach co najmniej jednotygodniowych,
- maksymalna dawka dobową nie powinna przekraczać 200 mg na dobę,
- działanie lecznicze produktu jest widoczne po 7 dniach stosowania jednakże najlepsze efekty otrzymuje się po dłuższym stosowaniu.

Działanie:

Produkt wykazuje silne działanie przeciwdepresyjne.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 100 mg chlorowodoru sertraliny.

Przeciwwskazania:

Jednym z najważniejszych przeciwwskazań do stosowania leku jest nadwrażliwość na sertralinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wszelkie inne przeciwwskazania do stosowania produktu zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku.

Działania niepożądane:

Stosowaniu leku towarzyszą różnego rodzaju działania niepożądane.

Objawiają się one zazwyczaj poprzez:

- zapalenie gardła,
- zwiększenie apetytu,
- bezsenność,
- depresja,
- koszmary senne,
- lęk,
- pobudzenie,
- nerwowość,
- zmniejszenie libido,
- zaburzenia czucia,
- drżenie,
- wzmożone napięcie,
- zaburzenia smaku,
- zaburzenia koncentracji,
- zaburzenia widzenia,
- szum uszny,

- kołatanie serca,
- uderzenia gorąca,
- ziewanie.

Należy mieć na uwadze iż działania niepożądane mogą objawiać się tylko u niektórych pacjentów, ich przebieg oraz nasilenie mogą być różne w zależności od stopnia choroby oraz pacjenta. Więcej informacji na temat działań niepożądanych można odnaleźć w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania bądź też uzyskać u lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.