

Simetigast Forte, kapsułki elastyczne, 0,24 g, 10 szt.



Nasza cena: 7,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,24 G
Opakowanie	*10
Postać	KAPS.ELAST.
Producent	Polpharma S.a. Starogard Gdański
Rejestracja	Bez recepty

Opis produktu

Opis

Simetigast Forte to wyrób medyczny w postaci kapsułek elastycznych. Każda kapsułka zawiera 240 mg symetykonu. Simetigast Forte przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w obrębie jamy brzusznej, do których należą: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.

Wyrób medyczny Simetigast Forte wspomaga również usuwanie piany, gazów i powietrza z przewodu pokarmowego przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej – ultrasonografią, endoskopią i radiografią, dzięki czemu ulega poprawie jakość uzyskiwanych obrazów. Simetigast Forte jest bezpieczny, ponieważ nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jedna kapsułka przyjmowana dwa razy dziennie zapewnia właściwy efekt.

Działanie:

Simetigast Forte zawiera symetykon, który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu znajdujących się w przewodzie pokarmowym, co powoduje ich pęknięcie. W ten sposób ułatwia wydalanie gazów.

Simetigast Forte poprawia widoczność podczas badań diagnostycznych, gdyż zapobiega nakładaniu się gazów i pniącej się treści pokarmowej na obraz badanych narządów.

Dawkowanie - Simetigast Forte, kapsułki elastyczne, 0,24 g, 10 szt.

Wygodny w stosowaniu przy wzdęciach: tylko jedna kapsułka 2-3 razy dziennie (dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia).

Przed badaniami diagnostycznymi: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie i 1 kapsułka rano w dniu badania.

Simetigast Forte należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wystarczającą ilością płynu.

Składniki - Simetigast Forte, kapsułki elastyczne, 0,24 g, 10 szt.

1 kapsułka zawiera 240 mg symetykonu oraz substancje pomocnicze: żelatynę, glicerynę, żółcień pomarańczową oraz wodę oczyszczoną.

Przeciwwskazania - Simetigast Forte, kapsułki elastyczne, 0,24 g, 10 szt.

Brak doniesień o znaczących działaniach niepożądanych po zastosowaniu symetykonu.
Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiadomić o nich wytwórcę.