

# Sintrom 4 mg 20 tabletek

Nasza cena: 9,66 zł

## Opis słownikowy

Dawka	4MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	NOVARTIS PHARMA GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ACENOCOUMAROLUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu i zapobieganiu chorobom zakrzepowo - zatorowym.

### Dawkowanie:

Dawka leku jest różna w zależności od stopnia zaawansowania choroby danego pacjenta. Szczegółowych informacji na temat stosowania leku udziela lekarz prowadzący. Zazwyczaj stosuje się dawkę wynoszącą od 2 do 4 mg/dobę.

### Działanie:

- przeciwwzakrzepowe
- przeciwwzatorowe

### Skład:

1 tabletki zawiera 4 mg acenokumarolu.

### Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na acenokumarol i podobne pochodne kumaryny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną,
- ciąża,

- krótko przed zabiegiem lub po zabiegu chirurgicznym OUN, a także operacji oczu i rozległych zabiegów chirurgicznych,
- choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy,
- krwawienie z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego lub oddechowego, krwawienie mózgowie,
- ostre zapalenie osierdzia,
- wysięk osierdziowy,
- zapalenie wsierdzia wywołane przez czynniki zakaźne,
- ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- ciężkie zaburzenia czynności nerek,
- zwiększona aktywność fibrynolityczna.

### **Działania niepożądane:**

Najczęstszym działaniem niepożądanym jest krwotok z różnych narządów. Jego intensywność jest zależna od dawki leku jaki został przyjęty.

W celu poznania szczegółowych informacji na temat działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem prowadzącym bądź farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.