

Sirupus Pini Compositum, syrop, 125 g



Nasza cena: 7,84 zł

Opis słownikowy

Dawka	(0,42G+0,064G+3,2MG)
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	125g
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PINUS SYLVESTRIS, FOENICULUM VULGARE, CO

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z intensywnym kaszlem i uczuciem duszności.

Dawkowanie - Sirupus Pini Compositum, syrop, 125 g

Doustnie: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 15 ml syropu. U dzieci w wieku poniżej 12 lat syrop można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Składniki - Sirupus Pini Compositum, syrop, 125 g

W 100g syropu zawarte jest:

6,6g wyciągu sosnowego DER (1:1,6),

1g nalewki koprowej,

0,05g fosforanu kodeiny.

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas fosforowy 85%, mleczan wapnia, woda oczyszczona.

Preparat zawiera do 7% vol. alkoholu.

15 ml syropu zawiera 9 mg fosforanu kodeiny.

Działania

Jest to produkt leczniczy zawierający w swoim składzie fosforan kodeiny o działaniu przeciwkaszlowym.

Wskazania - Sirupus Pini Compositum, syrop, 125 g

Doraźnie w suchym męczącym kaszlu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania - Sirupus Pini Compositum, syrop, 125 g

Ze względu na zawartość etanolu lek nie może być stosowany przy uszkodzeniu wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu i chorobach umysłowych.

Nie zaleca się stosowania w chorobach układu oddechowego przebiegających z zaleganiem gęstej wydzieliny w drzewie oskrzelowym i z utrudnionym odkrztuszaniem.

Nadwrażliwość na składniki leku.

Nie stosować u osób z astmą oskrzelową lub tendencją do skurczu oskrzeli, w ostrej niewydolności oddechowej.

Nie stosować u pacjentów z przewlekłym zaparciem.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat, natomiast u dzieci w wieku 6-12 należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

U osób wrażliwych na którykolwiek składnik leku może wystąpić reakcja alergiczna.

Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, spadki ciśnienia, zmniejszenie częstości oddechu, skurcz oskrzeli, trudności w oddawaniu moczu, zaparcia, kolka żółciowa, nudności, wymioty, uczucie suchości w jamie ustnej.

Uwagi

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ze względu na możliwość wystąpienia senności należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.