

Skudexa 75 mg + 25 mg 10 tabletek

Nasza cena: 17,45 zł

Opis słownikowy

Dawka	75MG+25MG
Opakowanie	*10
Postać	TABL.POWL.
Producent	BERLIN CHEMIE AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TRAMADOLUM, DEXKETOPROFENUM

Opis produktu

Opis

Skudexa, 75 mg + 25 mg, 10 tabletek powlekanych

Skudexa to połączenie dwóch substancji o silnym działaniu przeciwzapalnym i opioidalnym: deksketoprofenu i tramadolu. Skudexa ma zastosowania w objawowym leczeniu ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u pacjentów. Każda tabletkę Skudexy zawiera: 75 mg tramadolu chlorowodoru i 25 mg deksketoprofenu.

Substancje pomocnicze : o znanym działaniu: każda tabletkę zawiera 33,07 kroscarmelozy sodowej i 1,83 mg sodu stearylofumaranu.

Skład leku

substancja czynna: 75 mg tramadolu chlorowodoru i 25 mg deksketoprofenu.

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, kroscarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran i krzemionka koloidowa bezwodna

Otoczka: Opadry II white 85F18422 o składzie: Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)Makrogol 3350Talk

Skudexa: prawie białe do lekko żółtych, podłużne tabletkę powlekane z rowkiem dzielącym po jednej stronie oraz wytłoczonym „M” po drugiej stronie. Wymiary tabletkę to w przybliżeniu 14 mm długości i 6 mm szerokości.

Linia podziału na tabletkę ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna tabletkę powlekana dziennie. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, zachowując odstęp pomiędzy dawkami co najmniej 8 godzin. Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać trzech tabletek powlekanych na dobę (co odpowiada 225 mg tramadolu chlorowodoru i 75 mg deksketoprofenu). Skudexa jest wskazana wyłącznie do krótkotrwałego

stosowania, a leczenie powinno być ściśle ograniczone do okresu, w którym występują objawy choroby i w każdym przypadku nie trwać dłużej niż 5 dni. W zależności od intensywności bólu i odpowiedzi pacjenta na leczenie powinno się rozważyć zmianę na jednoskładnikowy lek przeciwbólowy.

Produkt leczniczy Skudexa należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanka wody). Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu leczniczego, dlatego w celu szybszego efektu wywołania zaleca się podawanie tabletki co najmniej 30 minut przed posiłkami.

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Produktu leczniczego Skudexa nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 59 ml/min).

Stosowanie leku Skudexa u dzieci i młodzieży

Produktu leczniczego Skudexa nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Interakcje z innymi lekami

Należy wziąć pod uwagę interakcje odnotowane dla deksketoprofenu i tramadolu stosowanych w monoterapii.

Skudexa a ciąża, karmienie piersią i płodność

- Podczas stosowania leku u kobiet w ciąży należy skonsultować się z lekarzem
- Tabletki Skudexa są przeciwwskazane do stosowania u kobiet karmiących piersią
- Stosowanie deksketoprofenu może zaburzać płodność kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ dotyczący pojedynczych składników produktu leczniczego Skudexa ma zastosowanie także dla substancji stosowanych łącznie.

Deksketoprofen

Deksketoprofen wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn w związku z możliwością wystąpienia zawrotów głowy lub senności.

Tramadol

Nawet w zalecanych dawkach tramadol może powodować objawy jak senność i zawroty głowy i tym samym zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. Dotyczy to szczególnie przypadków jednoczesnego stosowania z alkoholem lub innymi substancjami psychotropowymi.

Skutki uboczne

Mogą wystąpić działania niepożądane charakterystyczne dla substancji czynnych: deksketoprofen i tramadol

W badaniach klinicznych najczęściej obserwowanymi objawami niepożądanymi były wymioty, nudności i zawroty głowy (odpowiednio 2,9%, 2,7% i 1,1% pacjentów).

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze skutki uboczne stosowania leku Skudexa. Pełny wykaz objawów niepożądanych znajduje się na ulotce opakowania.

bardzo częste skutki uboczne:	nudności, zawroty głowy
częste skutki uboczne:	biegunka, wymioty, bóle brzucha, senność, zmęczenie, zaparcia, nadmierne pocenie się, suchość w ustach
niezbyt częste skutki	wzrost poziomu płytek krwi, objawy sercowe (kołatanie, szybkie bicie), omdlenia, wysokie ciśnienie tętnicze,

uboczne:	zaburzenia psychotyczna, płytki i powolny oddech, uczucie wirowania, bezsenność, nerwowość, niepokój, wzdęcia, zmęczenie, uczucie gorączki, odruchy wymiotne, zapalenie żołądka, reakcje skórne
rzadkie skutki uboczne:	choroba wrzodowa (dwunastnicy, żołądka), krwawienie z przewodu pokarmowego z objawami krwawych wymiotów / czarnych stolców, zapalenie wątroby, uszkodzenie wątroby, napady padaczki, niewydolność nerek, reakcje alergiczne, zaburzenia percepcji, drżenie mięśni, duszność, zaburzenia widzenia
bardzo rzadkie skutki uboczne:	zapalenie trzustki, problemy z nerkami, zmniejszona liczba białych krwinek / płytek krwi, dzwonięcie w uszach, nadwrażliwość skóry, nadwrażliwość na światło

Spożycie większej dawki leku

Nie odnotowano przypadków zatruc. Należy wziąć pod uwagę dane odnotowane dla deksketoprofenu i tramadolu stosowanych w monoterapii.

Przechowywanie leku Skudexa

Bez specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje

Podmiot odpowiedzialny

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg Luksemburg

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.