

Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)



Nasza cena: 7,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIOSMECTITUM

Opis produktu

Opis

Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

Preparat stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci.

Dawkowanie - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

- dzieci po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w przypadku biegunek ostrych:
- do 1 roku - 1 saszетка na dobę.
- w wieku od 1 do 2 lat - 1 do 2 saszetek na dobę.
- powyżej 2 lat - 2 do 3 saszetek na dobę.
- dorośli: zwykle podaje się 3 saszetki na dobę.

Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.

Składniki - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

1 saszетка zawiera:

- diosmektyt 3g,
- substancje pomocnicze: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat waniliowy, aromat pomarańczowy.

Działania

Preparat wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Na skutek oddziaływania z występującymi w śluzie glikoproteinami Smecta zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu na czynniki drażniące. Smecta ochrania błonę śluzową przewodu pokarmowego, jest przepuszczalna dla promieniowania rentgenowskiego, nie barwi kału oraz w stosowanych zwykle dawkach nie zmienia fizjologicznego czasu pasażu jelitowego.

Przeciwwskazania - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

- nietolerancja fruktozy,
- zespół złego wchłaniania glukozy i/lub galaktozy,
- niedobór sacharazy-izomaltazy,
- nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przeciwwskazania - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

Bardzo rzadko obserwowano przypadki wystąpienia lub nasilenia zaparcia - leczenie można było kontynuować po zmniejszeniu dawki. U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne reakcje niepożądane.

Uwagi

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.