

## Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)



Nasza cena: 8,62 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DIOSMECTITUM

### Opis produktu

#### Opis

### Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

Preparat stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci.

### Dawkowanie - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

- dzieci po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w przypadku biegunek ostrych:
- do 1 roku - 1 saszetka na dobę.
- w wieku od 1 do 2 lat - 1 do 2 saszetek na dobę.
- powyżej 2 lat - 2 do 3 saszetek na dobę.
- dorośli: zwykle podaje się 3 saszetki na dobę.

Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, można podwoić dawkę dobową.

### Składniki - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)

1 saszetka zawiera:

- diosmektyt 3g,
- substancje pomocnicze: glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat waniliowy, aromat pomarańczowy.

### Działania

Preparat wykazuje silne właściwości powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Na skutek oddziaływania z występującymi w śluzie glikoproteinami Smecta zwiększa wytrzymałość warstwy śluzu na czynniki drażniące. Smecta ochrania błonę śluzową przewodu

pokarmowego, jest przepuszczalna dla promieniowania rentgenowskiego, nie barwi kału oraz w stosowanych zwykle dawkach nie zmienia fizjologicznego czasu pasażu jelitowego.

### **Przeciwwskazania - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)**

- nietolerancja fruktozy,
- zespół złego wchłaniania glukozy i/lub galaktozy,
- niedobór sacharazy-izomaltazy,
- nadwrażliwość na składniki preparatu.

### **Przeciwwskazania - Smecta, zawiesina, 10 saszetek (import równoległy)**

Bardzo rzadko obserwowano przypadki wystąpienia lub nasilenia zaparcia - leczenie można było kontynuować po zmniejszeniu dawki. U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne reakcje niepożądane.

### **Uwagi**

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**