

Solcoseryl 10%, żel 20 g



Nasza cena: 17,34 zł

Opis słownikowy

Dawka	10%
Opakowanie	20g
Postać	ZEL
Producent	Meda Pharma
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Substancją czynną leku Solcoseryl jest wolny od antygenów bezbiałkowy dializat z krwi cieląt. Dzięki temu żel ułatwia procesy regeneracyjne i naprawcze w obrębie komórek i przyspiesza odnowę tkanek.

Dawkowanie - Solcoseryl 10%, żel 20 g

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Nanieść 2 razy na dobę cienką warstwę na oczyszczoną ranę.

Składniki - Solcoseryl 10%, żel 20 g

Substancja czynna: bezbiałkowy dializat z krwi cieląt (w przeliczeniu na suchą masę 4,15 mg na 1g żelu)

Substancje pomocnicze: matylu parahydroksybenzoesan, propyly parahydroksybenzoesan, wapnia mleczan pięciowodny, karmeloza sodowa, glikol propylenowy, woda do wstrzykiwań.

Działania

Solcoseryl stymuluje w komórkach tlenowe procesy metaboliczne i zwiększa ilość substancji dostarczających komórkom energii. Ponadto aktywuje transport tlenu i substancji odżywczych do komórek oraz ułatwia ich przyswajanie. Dzięki temu ułatwia procesy regeneracyjne i naprawcze w obrębie komórek i przyspiesza odnowę tkanek.

Wskazania - Solcoseryl 10%, żel 20 g

- Małych ran,

- wrzodów pochodzenia żylnego i innych źle gojących się ran,
- oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, blizn pooparzeniowych,
- odmrożeń,
- zmian troficznycych u osób ze schorzeniami zarostowymi tętnic,
- źle gojących się ran odleżyn,
- miejsc pobrania skóry do przeszczepów, rozległych przeszczepów siatkowych skóry,
- popromiennych uszkodzeń skóry.

Przeciwwskazania - Solcoseryl 10%, żel 20 g

Nadwrażliwość na bezbiałkowy dializat z krwi cieląt lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie stosować u pacjentów poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania - Solcoseryl 10%, żel 20 g

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne (zaczerwienienie, świąd skóry) W miejscu zastosowania żelu może również wystąpić uczucie pieczenia, które jednak jest przemijające i nie wymaga odstawienia leku.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.