

# Solderol 30 000 I.U. , 8 tabletek powlekanych

Nasza cena: 47,17 zł

## Opis słownikowy

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Dawka             | 30 000 I.U.                       |
| Opakowanie        | *8                                |
| Postać            | TABL.POWL.                        |
| Producent         | LEK-AM ZAKROCZYN P.F. POLSKA [PL] |
| Rejestracja       | Lek na receptę pełnopłatny        |
| Substancja czynna | VITAMINUM D                       |

## Opis produktu

### Opis

## Solderol 30 000 I.U. 8 tabletek powlekanych -Cholecalciferolum (Witamina D3)

### Spis treści

- Podstawowe informacje
- Skład
- Dawkowanie
- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Interakcje z innymi lekami
- Działania niepożądane / skutki uboczne
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
- Przechowywanie
- Podmiot odpowiedzialny

### Podstawowe informacje

#### Co to jest Solderol ?

Substancją czynną Solderol tabletki powlekane jest witamina D3.

Witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wapń, zwiększa tworzenie kości i zmniejsza stężenie hormonu przytarczyc (PTH).

#### Wskazania do stosowania

- Osteoporoza

- W zapobieganiu lub w leczeniu niedoboru witaminy D lub gdy organizm potrzebuje większej ilości witaminy D (np. w czasie ciąży).

Solderol jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży.

## Skład

|  |   |
|--|---|
| Każda tabletką Solderol 30 000 I.U. zawiera: | 750 mcg cholekalcyferolum (co odpowiada 30 000 j.m. witaminy D3).   |
| Pozostałe składniki to:                      | <b>Rdzeń tabletki:</b> cellactose 80 (laktoza jednowodna i celuloza sproszkowana (E460 (ii)), skrobia kukurydziana zmodyfikowana, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa (E468), sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna (E551), krzemionka koloidalna uwodniona (E551), magnezu stearynian (E572), sodu askorbinian (E301), trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, all-rac-alfa-tokoferol (E307).<br><b>Otoczka:</b> Opadry II Yellow 85F 32659, składająca się z: alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol, talk (E553b), żółcień chinolinowa, lak (E104), żelaza tlenek żółty (E172). |

## Dawkowanie

### Jak przyjmować Solderol tabletki powlekane

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.  
Tabletki mogą być przyjmowane z jedzeniem lub bez.

### Zalecana dawka

Dawka witaminy D zależy będzie od stężenia witaminy D w organizmie pacjenta i odpowiedzi na leczenie.

### Zapobieganie niedoborom witaminy D (terapia podtrzymująca):

u dorosłych i osób w podeszłym wieku: 800 do 1600 j.m. na dobę, albo równoważność dawki tygodniowej lub miesięcznej.  
u dorosłych i osób w podeszłym wieku z osteoporozą: maksymalnie 2000 j.m./ na dobę, albo równoważność dawki tygodniowej lub miesięcznej.

### W ciężkim niedoborze witaminy D u dorosłych i osób w podeszłym wieku (dawka początkowa):

800 do 4000 j.m. na dobę, albo równoważność dawki tygodniowej lub miesięcznej.

### Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić regularne badania krwi i moczu.

### Przyjęcie większej niż zalecana dawki

Mogą wystąpić następujące objawy: utrata apetytu, nasilone pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, zmęczenie, splątanie, częstsze oddawanie moczu, ból kości, zaburzenia czynności nerek, oraz w ciężkich przypadkach nieregularna praca serca, śpiączka lub nawet zgon.

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek należy skontaktować się natychmiast z lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku oraz ewentualne niezużyte tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## Stosowanie u dzieci

Solderol nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

### Stosowanie u młodzieży (12 – 18 lat):

800 j.m. dziennie w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi na leczenie. Lek powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą medyczną.

### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko albo karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli pacjentka karmi piersią, lekarz będzie kontrolować stężenie wapnia lub fosforanów we krwi lub stężenie wapnia w moczu.

### Nie należy przyjmować tabletek jeśli:

- pacjent ma uczulenie na witaminę D lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- występuje duże stężenie wapnia we krwi lub moczu,
- występuje kamica nerkowa lub zwapnienia w nerkach,
- występuje ciężka niewydolność nerek,

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Solderol tabletki powlekane zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

### Należy poinformować lekarza jeżeli:

- pacjent ma skłonność do tworzenia się kamieni nerkowych
- pacjent jest chory na raka lub inną chorobę która może wpływać na kości
- u pacjenta występuje zaburzenie równowagi hormonu przytarczyc (rzekoma niedoczynność przytarczyc)

### Interakcje z innymi lekami

#### Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje następujące leki:

- leki moczopędne
- kortykosteroidy
- kolestyramina
- leki nasercowe
- leki przeciwdrgawkowe
- kalcytonina, etydronian, azotan galu, pamidronian lub plikamycyna
- produkty zawierające wapń w dużych dawkach
- produkty zawierające magnez
- produkty zawierające fosfor w dużych dawkach

### Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### Należy zaprzestać przyjmowania leku Solderol jeśli wystąpią:

- obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
- trudności w połykaniu
- pokrzywka i trudności w oddychaniu.

## Niezbyt częste skutki uboczne

- zbyt duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) - objawy obejmują nudności, wymioty, utratę apetytu, zaparcia, ból żołądka, ból kości, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, osłabienie mięśni, senność i splątanie
- zbyt duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria).

## Rzadkie działania niepożądane

- świąd, wysypka i pokrzywka.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany jakikolwiek wpływ leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

## Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK AM Sp. z o.o.  
ul. Ostrzykowitzna 14A  
05-170 Zakroczym Polska  
tel.: +48 22 785 27 60  
faks: +48 22 785 27 60 wew. 106

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.