

Solpadeine, 12 tabletek musujących



Nasza cena: 15,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5G+0,03G+8MG
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	*12
Postać	TABL.MUS.
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP.Z O.O POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, COFFEINUM, CODEINUM

Opis produktu

Opis

Solpadeine, 12 tabletek musujących

Lek zawiera 3 substancje czynne: paracetamol, kofeinę i kodeinę. Jego działanie lecznicze jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe.

Wskazania - Solpadeine, 12 tabletek musujących

Bóle głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła, objawy grypy i przeziębienia, gorączka.

Dawkowanie - Solpadeine, 12 tabletek musujących

Dorośli i dzieci od 12 lat: 2 tabletki musujące rozpuścić w szklance wody, podawać 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby.

Składniki - Solpadeine, 12 tabletek musujących

(1 tabletki): paracetamol 500 mg, fosforan kodeiny 8 mg, kofeina 30 mg, substancje pomocnicze: sorbitol proszek, sacharyna sodowa, wodorowęglan sodu, powidon, laurylosiarczan sodu, dimetykon, kwas cytrynowy bezwodny, węglan sodu bezwodny.

Przeciwwskazania - Solpadeine, 12 tabletek musujących

Nadwrażliwość na kodeinę, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników leku; choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby i nerek, niewydolność oddechowa, astma oskrzelowa, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) - leki stosowane w depresji i w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu. Nie podawać leku dzieciom poniżej 12 roku życia. Nie stosować leku w ciąży i podczas karmienia piersią. Nie stosować u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Skutki uboczne

Reakcje alergiczne np. wysypka skórna. Mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, ponadto uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka, po przedawkowaniu - zaburzenia czynności wątroby i nerek. Bardzo rzadko może wystąpić trombocytopenia, methemoglobinemia, agranulocytoza. Po zastosowaniu kodeiny może wystąpić uspokojenie, euforia, zaburzenia nastroju, zwężenie źrenic, zatrzymanie moczu, reakcje nadwrażliwości, zaparcia, nudności, wymioty, senność, zawroty głowy, skurcz oskrzeli, zahamowanie ośrodka oddechowego, ostry ból brzucha z cechami bólu charakterystycznego dla schorzeń dróg żółciowych lub trzustki.

Interakcje

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO, estrogenów i progesteronu, soli litu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Kodeina nasila hamujące działanie na ośrodek oddechowy innych opioidowych leków przeciwbólowych. Jednoczesne stosowanie z lekami cholinolitycznymi może spowodować niedrożność porażoną jelit.

Pobierz ulotkę Solpadeine 12 tabletek musujących

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.