

# Solpadeine Max, 16 tabletek musujących



Nasza cena: 27,27 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,5G+0,03G+0,0128G
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	*16
Postać	TABL.MUS.
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, COFFEINUM, CODEINUM

## Opis produktu

### Opis

## Solpadeine Max 16 tabletek musujących

Preparat przeciwbólowy, przeciwgorączkowy

### Wskazania

Preparat jest wskazany w przypadku:

- bólów różnego pochodzenia (ból głowy, migrena, bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, nerwobóle, bóle reumatyczne, ból gardła)
- objawów grypy i przeziębienia
- gorączki.

Kodeina jest wskazana u młodzieży po 12. roku życia, w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu innych leków przeciwbólowych stosowanych w monoterapii, takich jak paracetamol lub ibuprofen.

### Składniki

Składniki	ilość mg w 1 tabletkie
Paracetamol	500

Kofeina	12,8
Kodeina	30

## Dawkowanie

Dorośli: 1–2 tabletki co 4–6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę.

Młodzież w wieku 16–18 lat: 1–2 tabletki co 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę.

Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę (co jest równoważne 4 g paracetamolu, 102,4 mg fosforanu kodeiny i 240 mg kofeiny).

Młodzież w wieku 12–15: 1 tabletki co 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę.

Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę (co jest równoważne 2 g paracetamolu, 51,2 mg fosforanu kodeiny i 120 mg kofeiny).

Nie zaleca się stosowania preparatu w objawowym leczeniu przeziębienia u dzieci w wieku 12–18 lat z zaburzeniami układu oddechowego.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Preparat należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy czas. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. Jeżeli nie uzyska się znaczącego złagodzenia bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi w swym składzie paracetamol, kodeinę lub kofeinę.

## Przeciwwskazania

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:

- z depresją oddechową
- z przewlekłymi zaparciami
- szybko metabolizujących leki z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450
- u dzieci i młodzieży do 18. roku życia po zabiegu usunięcia migdałka podniebiennego i/lub gardłowego w ramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu sennego

a także:

- u kobiet w okresie karmienia piersią.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**