

Sonol przeciw opryszczce, płyn 8 g



Nasza cena: 18,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	8g
Postać	PLYN
Producent	ELANDA ROZPRZA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MENTHOLUM, THYMOLUM, ACIDUM SALICYLOSALI

Opis produktu

Opis

Lek złożony w formie płynu do stosowania na skórę, stosowany zewnętrznie jako środek pomocniczy w leczeniu chorób zakaźnych skóry. Substancjami czynnymi są: kwas salicylowy, mentol i tymol.

Dawkowanie - Sonol przeciw opryszczce, płyn 8 g

Dorośli i dzieci od 12 roku życia: zewnętrznie. Miejsca swędzące i wykwyty na wargach smarować cienko i równomiernie początkowo 4-5 razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy na dobę.

Składniki - Sonol przeciw opryszczce, płyn 8 g

(1 ml) mentol racemiczny 21 mg, kwas salicylowy 21 mg, tymol 2 mg. Substancja pomocnicza: glikol propylenowy.

Działania

Łagodzi objawy opryszczki.

Wskazania - Sonol przeciw opryszczce, płyn 8 g

Opryszczka.

Przeciwwskazania - Sonol przeciw opryszczce, płyn 8 g

Nie zaleca się stosowania produktu na otwarte rany, błony śluzowe i skórę uszkodzoną, przy nadwrażliwości na składniki preparatu. Nie wolno stosować u noworodków i dzieci do 12 lat życia. Nie stosować w przypadku rozległych zmian złuszczeniowych (np łuszczyca).

Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi składniki złuszczące np. rezorcynę, siarkę ponieważ może nastąpić podrażnienie skóry.

Produktu Sanol nie można stosować w okresie ciąży i karmienia, bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania - Sonol przeciw opryszczce, płyn 8 g

Jak każdy lek, Sonol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Podrażnienie skóry. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Uwagi

Lek nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ponieważ kwas salicylowy bardzo łatwo wchłania się przez skórę nie powinien być stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.