

# Soolantra (Iwermektyna) krem 30 g

Nasza cena: 118,72 zł

## Opis słownikowy

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Dawka             | 0,01 G/G                       |
| Opakowanie        | 30 g (tuba)                    |
| Postać            | KREM                           |
| Producent         | Galderma Sp. Z O.o. Polska [P] |
| Rejestracja       | Lek na receptę pełnopłatny     |
| Substancja czynna | IVERMECTINUM                   |

## Opis produktu

### Opis

## Soolantra (Iwermektyna) krem 30 g

### Spis Treści

- Informacje podstawowe
- Skład leku
- Dawkowanie / zastosowanie kremu Soolantra
- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Działania niepożądane / skutki uboczne
- Przechowywanie leku
- Informacje dodatkowe

## Informacje podstawowe

Soolantra zawiera substancję czynną iwermektynę, która należy do leków z grupy awermektyny. Substancja ta ma działanie przeciwzapalne. Mechanizm działania substancji aktywnej polega hamowaniu wytwarzania zapalnych cytokin, które są odpowiedzialne za rozwijanie stanu zapalnego skóry. Krem ma zastosowanie w leczeniu zmian (takich jak grudki, krostki, wypryski) spowodowanych przebiegiem trądzika różowatego. Lek ten dostępny jest na receptę. Krem można stosować wyłącznie u osób dorosłych i wyłącznie na okolice twarzy.

## Skład leku

Tabela zawiera skład farmakologiczny

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Jeden gram kremu zawiera: | 10 mg iwermektyny. |
|---------------------------|--------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pozostałe składniki leku to: | glicerol, izopropylu palmitynian, karbomer, dimetykon, disodu edetynian, kwas cytrynowy jednowodny, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), fenoksyetanol, glikol propylenowy, alkohol oleilowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona. |
| Postać:                      | Krem o barwie białej do jasnożółtej. Tuba zawierająca 15 g lub 30 g kremu, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci.  |
| Dawkowanie:                  | Aplikować wyłącznie na skórę twarzy raz na dobę. <b>Nie należy stosować tego leku na innych częściach ciała.</b>  |
| Przechowywanie:              | Ten lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu  |

## Dawkowanie / zastosowanie kremu

Zalecana dawka to jedna aplikacja na skórę twarzy na dobę.

Przed zastosowaniem kremu nie należy stosować kosmetyków (takich jak kremy do twarzy lub inne elementy makijażu) . Produkty te można zastosować po wyschnięciu naniesionego kremu.

Krem aplikować w ilości odpowiadającej ziarnku grochu w każdej z następujących okolic twarzy:

- na czoło,
- podbródek,
- nos
- na każdy policzek.

Należy rozprowadzić krem cienką warstwą na całej powierzchni twarzy, unikając okolic powiek, warg, oraz jakichkolwiek błon śluzowych.

Po nałożeniu kremu należy umyć dokładnie ręce.

## Cykl leczenia

Krem stosuje się codziennie przez cały okres leczenia; cykl leczenia można powtórzyć.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować lek Soolantra.

Poprawę można zaobserwować po 4 tygodniach leczenia.

W przypadku braku poprawy po 3 miesiącach należy zaprzestać stosowania leku Soolantra i skonsultować się z lekarzem.

### Zaburzenia czynności wątroby

Jeżeli u pacjenta występują problemy dotyczące wątroby, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować kremu Soolantra u dzieci i młodzieży.

### Otwieranie/ zamykanie tubki kremu

Aby otworzyć tubkę należy nacisnąć zakrętkę i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo). Następnie zdjąć zakrętkę.

Aby zamknąć tubkę nacisnąć zakrętkę i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w prawo).

Aby uniknąć rozlania leku, nie ścisnąć tubki podczas jej otwierania lub zamykania.

### Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku

W przypadku zastosowania dawki większej niż zalecana dawka dobową, należy skontaktować się z lekarzem, który doradzi, jakie działania należy podjąć.

#### Pominięcie dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

#### Przerwanie stosowania leku

Krostki i grudki zmniejszą się dopiero po kilku zastosowaniach tego leku. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Soolantra tak długo, jak zaleci to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Na początku leczenia u niektórych pacjentów może wystąpić pogorszenie objawów trądziku różowatego.

Nie stosować kremu jeżeli pacjent ma uczulenie na iwermektynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

## Interakcje z innymi lekami

Inne leki mogą mieć wpływ na krem Soolantra; dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

## Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania kremu Soolantra w okresie ciąży.

Jeśli pacjentka karmi piersią, nie powinna stosować tego leku. Należy skonsultować się z lekarzem, który pomoże w podjęciu decyzji czy zastosować lek czy karmić piersią, uwzględniając korzyści z leczenia oraz korzyści wynikające z karmienia piersią.

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wykazuje wpływu lub wykazuje niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

## Lek zawiera:

- alkohol cetylowy i alkohol stearylowy które mogą wywoływać powodować reakcje skórne;
- metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne;
- glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry;

## Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek może powodować następujące działania niepożądane:

|   |  |
|---|--|
| Częste skutki uboczne działania leku Soolantra            | uczucie pieczenia skóry  |
| Niezbyt częste skutki uboczne                             | podrażnienie skóry<br>świąd skóry<br>suchość skóry<br>pogorszenie objawów trądziku różowatego                        |
| Nieokreślona częstotliwość występowania skutków ubocznych | zaczerwienienie skóry<br>zapalenie skóry<br>obrzęk twarzy<br>zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT/AspAT) |

## Przechowywanie leku

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności;
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.
- Ten lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.

## Informacje dodatkowe

### Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 145  
02-715 Warszawa Polska  
tel.: +48 22 331 21 80

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2020

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.