

Spironol 100 mg 20 tabletek

Nasza cena: 3,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	100MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	POLFA GRODZISK MAZOWIECKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	SPIRONOLACTONUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- zastoinowa niewydolność serca,
- marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem,
- wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego,
- zespół nerczycowy,
- diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu,
- leczenie nadciśnienia tętniczego, jako lek dodatkowy u pacjentów niereagujących dostatecznie na inne leki przeciwnadciśnieniowe,
- zastoinowa niewydolność serca,
- zespół nerczycowy.

Dawkowanie:

Zastoinowa niewydolność serca z obrzękiem:

- 100 mg na dobę podawanej w dawce pojedynczej lub w kilku dawkach podzielonych, jednak zakres dawek może wynosić 25 mg - 200 mg na dobę.

Pacjenci z ciężką niewydolnością serca (klasy III-IV wg NYHA):

- 25 mg raz na dobę w skojarzeniu ze standardową terapią, jeżeli stężenie potasu w surowicy wynosi ≤ 5 mEq/l, a stężenie kreatyniny w surowicy wynosi $\leq 2,5$ mg/dl.

Marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem:

- Jeżeli stosunek jonów Na^+/K^+ w moczu ma wartość większą niż 1,0, należy zastosować dawkę 100 mg/dobę. Jeżeli stosunek ten ma wartość mniejszą niż 1,0, zaleca się dawkę 200-400 mg/dobę. Dawkę podtrzymującą należy wyznaczyć indywidualnie dla każdego pacjenta.

Wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego:

- 100-200 mg na dobę. W ciężkich przypadkach, dawkę można stopniowo zwiększać do 400 mg/dobę.

Zespół nerczycowy:

- 100-200 mg na dobę.

Leczenie nadciśnienia tętniczego:

- 25 - 100 mg na dobę. Pełny efekt terapeutyczny uzyskuje się zwykle w ciągu ok. 2 tyg.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z dawkowaniem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub też skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Działanie:

Spironolakton, jako kompetytywny antagonistą aldosteronu, powoduje zwiększenie wydalania sodu z jednoczesnym zmniejszeniem wydalania potasu w części dystalnej kanalika nerkowego. Wykazuje stopniowe i przedłużone działanie.

Skład:

1 tabletkę zawiera 100 mg spironolaktonu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjentów występuje któraś z poniższych dolegliwości:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra niewydolność nerek,
- ciężkie zaburzenia czynności nerek,
- bezmocz,
- Choroba Addisona,
- hiperkaliemia.

Nie należy stosować leku wraz z innymi lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas oraz nie należy rutynowo podawać suplementów potasu, ponieważ może wystąpić hiperkaliemia.

Stosowanie spironolaktonu nie jest wskazane do stosowania u dzieci i młodzieży z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Działania niepożądane:

- ginekomastia,
- powiększenie piersi,
- złe samopoczucie,
- nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy),
- łagodne nowotwory piersi,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
- nudności,
- leukopenia,
- małopłytkowość,
- zaburzenia czynności wątroby,
- zaburzenia elektrolitowe,
- hiperkaliemia,
- kurcze mięśni nóg,
- zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,
- zmiany libido,
- splątanie,
- zaburzenia miesiączkowania,
- ból piersi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.