

## Starazolin, krople do oczu, 0,05%, 2 x 5 ml



Nasza cena: 19,65 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,05%
Opakowanie	10 ml (2 x 5ml)
Postać	KROPLE D/OCZU
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TETRYZOLINUM

### Opis produktu

#### Opis

### Starazolin, krople do oczu, 0,05%, 2 x 5 ml

Lek **Starazolin** w postaci kropli do oczu zawiera substancję czynną tetryzolinę, która jest aminą sympatykomimetyczną, pochodną imidazoliny.

#### Wskazania:

W leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi, takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw.

#### Działanie:

Po miejscowym zastosowaniu leku do worka spojówkowego, zwężeniu ulegają małe naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek.

Lek może rozszerzać źrenice, ale działanie to występuje rzadko. Starazolin znosi objawy towarzyszące: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.

#### Dawkowanie:

Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle wkrapla się 1 do 2 kropli leku, 2 do 3 razy na dobę. Należy unikać długotrwałego stosowania leku, szczególnie u dzieci.

## Skład:

(1 ml): chlorowodrek tetryzolinu 0,5 mg, substancje pomocnicze: sodu chlorek, edetynian sodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy, wodę do wstrzykiwań.

## Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością na tetryzolinę lub którykolwiek składnik leku;
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat;
- z jaskrą, szczególnie z wąskim kątem lub innymi ciężkimi schorzeniami oczu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**