

Strepsils Intensive, tabletki do ssania, 24 szt.



Nasza cena: 37,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*24
Postać	TABL.D/SSANIA
Producent	BOOTS HEALTHCARE INTERN. /BOOTS COMPANY/ WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	FLURBIPROFENUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany krótkotrwale w objawowym leczeniu bólu gardła.

Dawkowanie - Strepsils Intensive, tabletki do ssania, 24 szt.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Tabletki należy ssać powoli. Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby. W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać by uniknąć miejscowego podrażnienia.

Jeśli po 3 dniach objawy bólu nie przemijają lub nasilają się, a także jeśli wystąpią nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza.

Składniki - Strepsils Intensive, tabletki do ssania, 24 szt.

Jedna tabletki do ssania zawiera flurbiprofen oraz makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy, miód.

Działania

Strepsils Intensive zawiera flurbiprofen, substancję o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Działa w miejscu powstawania ostrego bólu gardła. Działanie leku rozpoczyna się po około 30 minutach od przyjęcia i utrzymuje się do około 3 godzin.

Przeciwwskazania - Strepsils Intensive, tabletki do ssania, 24 szt.

Leku strepsils Intensive nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub któregośkolwiek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), wysypką,

- z istniejącą lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężkim zapaleniem jelita grubego,
- z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
- przyjmujących jednocześnie inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory cyklooksigenazy 2, takie jak celekoksyb),
- w III trymestrze ciąży,
- z ciężką niewydolnością serca,
- u pacjentów w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania - Strepsils Intensive, tabletki do ssania, 24 szt.

Reakcje nadwrażliwości:

Niezbyt często: reakcje skórne,

Rzadko: astma, niespodziewane trudności w oddychaniu, lub duszność, obrzęk twarzy, warg lub języka

Bardzo rzadko: omdlenia

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, nudności, biegunka

Niezbyt często: niestrawność, wymioty, wzdęcia

Zaburzenia w obrębie jamy ustnej

Bardzo często: uczucie gorąca/palenia w ustach,

Często: mrowienie w ustach, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zawroty głowy

Rzadko: uczucie senności lub bezsenność

Zaburzenia serca: W związku z leczeniem NLPZ w dużych dawkach mogą wystąpić obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca.

Uwagi

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- astmy oskrzelowej, zaburzeń czynności wątroby, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, niewydolności nerek, chorób serca, nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń krzepnięcia krwi;
- przyjmowania innych leków przeciwbólowych, zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych NLPZ,
- ciąży lub karmienia piersią,
- cukrzycy (każda tabletki do ssania zawiera 2,5 g węglowodanów, co odpowiada około 0,25 jednostki chlebowej).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.