

Sulfarinol, krople do nosa, 20 ml

Nasza cena: 14,32 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Postać	KROP.DO NOSA
Producent	Galenus Farm.-Chem.sp.pracy
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Krople do nosa Sulfarinol są białym, oleistym płynem zawierającym 2 substancje czynne.

Dawkowanie - Sulfarinol, krople do nosa, 20 ml

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 1-2 krople co 4-6 godzin do każdego otworu nosowego. Lek należy zakropić do każdego otworu nosowego na skrzydełko nosa, następnie kilkakrotnie zacinać nos palcem wskazującym i kciukiem. Przed użyciem wstrząsnąć.

Składniki - Sulfarinol, krople do nosa, 20 ml

Substancje czynne:

- sulfatiazol 50mg/1ml,
- azotan nafazoliny 1mg/1ml.

Substancje pomocnicze:

- parafina ciekła,
- woda,
- wosk biały.

Działania

Bakteriostatyczne na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne; adrenomimetyczne. Miejscowe zastosowanie na błonę śluzową nosa powoduje po ok. 5 minutach skurcz rozszerzonych naczyń krwionośnych co prowadzi do hamowania objawów związanych ze stanem zapalnym m.in. obrzęku i wysięku.

Wskazania - Sulfarinol, krople do nosa, 20 ml

Preparat stosowany w krótkotrwałym, doraźnym leczeniu objawów przekrwienia błony śluzowej nosa, w katarze, uczuciu zatkania nosa, obrzęku błony śluzowej nosa, spowodowanych przez stan zapalny związany z zakażeniem bakteryjnym.

Przeciwwskazania - Sulfarinol, krople do nosa, 20 ml

Nie stosować leku kiedy:

- u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie na sulfonamidy,
- jeśli u pacjenta występuje jaskra z zamkniętym kątem przesączania,
- jeśli u pacjenta występuje nieżyt nosa wysychający,
- u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przeciwwskazania - Sulfarinol, krople do nosa, 20 ml

Możliwe działania niepożądane:

- objawy uczuleniowe (wysypka skórna, obrzęk warg),
- kichanie,
- kłujący ból nosa,
- uczucie pieczenia,
- zwiększone wydzielanie z nosa,
- stany uczuleniowe.

Interakcje

Stosowanie leków zawierających nafazolinę u chorych leczonych trójpiersścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może nasilać ich działanie na naczynia krwionośne. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO może prowadzić do przełomu nadciśnieniowego.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.