

# Sumamed Forte 200 mg/5ml 20 ml

Nasza cena: 21,93 zł

## Opis słownikowy

Dawka	200MG/5ML
Opakowanie	20 ml
Postać	ZAW.
Producent	PLIVA KRAKÓW Z.F. S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	AZITHROMYCINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

- zakażenia górnych dróg oddechowych,
- bakteryjne zapalenie gardła,
- zapalenie migdałków, zapalenie zatok,
- ostre zapalenie ucha środkowego,
- zakażenia dolnych dróg oddechowych,
- ostre zapalenie oskrzeli,
- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
- lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc,
- zakażenia skóry i tkanek miękkich,
- róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry,
- rumień wędrujący - Erythema migrans.

### Dawkowanie:

Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Jest on przeznaczony zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

### **W zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych:**

1. całkowita dawka wynosi 30 mg na każdy kg masy ciała,
2. według schematu stosowania należy podawać 10 mg na każdy kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.
3. Dawkowanie u dzieci zależy od masy ciała:
  - 10-14 kg - 100 mg (2,5 ml),
  - 15-24 kg - 200 mg (5 ml),
  - 25-34 kg - 300 mg (7,5 ml),
  - 35-44 kg - 400 mg (10 ml),
  - powyżej 45 kg - należy stosować dawkę dla dorosłych.

### **W leczeniu rumienia wędrującego**

1. całkowita dawka wynosi 60 mg na każdy kg masy ciała
2. Lek należy podawać w następujący sposób:
  - 20 mg na każdy kg masy ciała pierwszego dnia,
  - następnie 10 mg na każdy kg masy ciała raz na dobę od 2 do 5 dnia leczenia.

### **Działanie:**

Lek wykazuje działanie przeciwbakteryjne.

### **Skład:**

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.

### **Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować leku jeżeli u któregokolwiek z pacjentów występują dolegliwości związane z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

### **Działania niepożądane:**

#### **Działania niepożądane jakie mogą towarzyszyć przyjmowaniu leku Sumamed to:**

- ból głowy
- wymioty,
- ból brzucha,
- nudności;
- zmniejszenie liczby limfocytów,

- zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych,
- zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi,
- zwiększenie liczby bazofilów,
- zwiększenie liczby monocytów,
- zwiększenie liczby neutrofilów,
- zawroty głowy,
- parestezje,
- zaburzenia smaku,
- zaburzenia widzenia,
- głuchota,
- wysypka,
- świąd,
- ból stawów,
- uczucie zmęczenia.

Warto zauważyć iż są to działania niepożądane występujące często, w celu zapoznania się z innymi działaniami niepożądanymi należy zasięgnąć informacji u lekarza prowadzącego bądź też w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Ważna informacja jest to iż działania niepożądane mogą występować jedynie u części pacjentów oraz u każdego z nich mogą przebiegać w inny sposób.

**Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**