

SUMATRIPTAN MEDICAL VALLEY 100 mg, 6 tabletek

Nasza cena: 40,82 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 MG
Opakowanie	*6
Postać	Tabletki
Producent	MEDICAL VALLEY INVEST AB SZWECJA [SE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	SUMATRIPTANUM

Opis produktu

Opis

SUMATRIPTAN MEDICAL VALLEY 100 mg, 6 tabletek

Sumatriptan Medical Valley zawiera 100 mg sumatriptanu w postaci bursztynianu sumatriptanu - substancję przeciwmigrenową. Objawy migreny mogą zależeć od przejściowego rozszerzenia naczyń krwionośnych w obrębie ukrwienia tętnicy szyjnej.

Sumatriptan należy do grupy leków będących antagonistami receptora 5HT₁, które to leki zwężają wspomniane naczynia krwionośne.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub sulfonamidy;
- u dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na to, że nie określono bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej;
- u pacjentów: którzy przebyli zawał mięśnia sercowego, lub u których występuje choroba niedokrwienna serca, skurcz naczyń wieńcowych (dławica Prinzmetal'a) lub choroby naczyń obwodowych;
- u których wystąpił w przeszłości udar lub przemijający napad niedokrwienny mózgu z ciężką niewydolnością wątroby;
- z umiarkowanym lub ciężkim nadciśnieniem oraz umiarkowanym niekontrolowanym nadciśnieniem;
- u pacjentów stosujących jednocześnie preparaty zawierające ergotaminę lub jej pochodne (w tym metyzergid) stosujących inhibitory MAO oraz w okresie dwóch tygodni od zaprzestania stosowania leków z tej grupy.

Sposób użycia i dawkowanie:

Dorośli:

Zalecana dawka doustna sumatryptanu to 1 tabletka 50 mg. Jednak czasem zalecane jest podanie 100 mg. W przypadku braku odpowiedzi na pierwszą dawkę, przyjęcie drugiej dawki podczas tego samego napadu migreny nie jest celowe.

W razie wystąpienia nawrotu objawów można przyjąć powtórnie jedną dawkę leku Sumatriptan Medical Valley, a w rzadko występujących przypadkach maksymalnie dwie dawki leku w ciągu 24 godzin, biorąc pod uwagę fakt, że minimalna przerwa pomiędzy dawkami to 2 godziny.

Maksymalna dawka dobową nie może być większa niż 300 mg. Sumatriptan należy przyjmować jak najszybciej po rozpoczęciu napadu migreny, jednak lek podany w dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u więcej niż 1 na 100, mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

- ból, uczucie mrowienia, gorąca lub uczucie zimna,
- uczucie ociężałości, rozpierania lub ściskania (zwykle przemijające, może być intensywne i może dotyczyć każdej części ciała w tym w klatce piersiowej i gardle),
- uczucie osłabienia i zmęczenia (w większości przypadków są one łagodne do umiarkowanych),
- senność, zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy,
- przemijające podwyższenie ciśnienia krwi tuż po podaniu leku i uderzenia gorąca,
- nudności, wymioty, duszność,
- ból mięśni.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- zaburzenia czynności wątroby.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.