

Suplasyn 20 mg/2 ml, roztwór sterylny hialuronianu sodu, 1 ampułko-strzykawka



Nasza cena: 93,64 zł

Opis słownikowy

Dawka	20MG/2ML
Postać	INJ.
Producent	GRUNENTHAL GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	ACIDUM HYALURONICUM

Opis produktu

Opis

Suplasyn 20mg/2ml 1 ampułko-strzykawka

Wyrób medyczny w postaci iniekcji dostawowych podawanych w celu zmniejszenia bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, polepszenia właściwości ruchowych stawu, poprawienia funkcji amortyzacyjnych i zwiększenia ilości substancji smarujących w stawie.

Dawkowanie

Dostawowo. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu określa lekarz.

Należy stosować ścisłą technikę antyseptyczną.

- Zdjąć końcówkę Luer.
- Założyć odpowiednią kaniulę
- Lekko dokręcić.

Produkt dozwolony do użycia tylko przez lekarza.

Skład

Wiskoelastyczny roztwór o określonej wadze molekularnej oczyszczonego kwasu hialuronowego, uzyskanego w procesie fermentacji.

Sól sodowa kwasu hialuronowego: 20 mg, substancje pomocnicze do objętości 2 ml.

Działanie

Opóźnia lub wręcz zatrzymuje proces degeneracyjny chrząstki stawowej. Zwiększa lepkości i elastyczności płynu stawowego. Preparat zawiera sól sodową kwasu hialuronowego.

Wskazania do stosowania

Zmniejszenie bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Polepszenie własności ruchowych stawu. Poprawa funkcji amortyzacyjnych i zwiększenie ilości substancji smarujących w stawie. Opóźnienie lub wręcz zatrzymanie procesu degeneracyjnego chrząstki stawowej. Zwiększenie lepkości i elastyczności płynu stawowego.

Przeciwwskazania

Poinformuj lekarza: Gdy masz nadwrażliwość na kwas hialuronowy. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.

Po wstrzyknięciu dostawowym może wystąpić przemijający krótkotrwały ból. W obrębie stawu mogą wystąpić łagodne odczyny jak ból, uczucie gorąca, zaczerwienienie i obrzęk. U większości pacjentów objawy ustępują w ciągu kilku dni. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje miejscowe o większym nasileniu i gorączka. W razie powyższych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.