

Suvardio 20 mg 28 tabletek

Nasza cena: 5,62 zł

Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	SANDOZ GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ROSUVASTATINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania gdy u pacjenta występują dolegliwości związane z:

- pierwotną hipercholesterolemią (typu IIa, w tym heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna),
- mieszaną dyslipidemią (typu IIb) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych,
- uzupełnieniem diety, gdy odpowiedź na stosowanie diety i inne nefarmakologiczne metody leczenia (np. ćwiczenia fizyczne) jest niewystarczająca,
- zapobieganiem dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów zaliczanych do grupy wysokiego,
- jako uzupełnienie metod stosowanych w celu skorygowania innych czynników ryzyka.

Dawkowanie:

Zanim zostanie rozpoczęte leczenie lekiem Suvardio pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu. Dietę należy kontynuować w czasie trwania leczenia.

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie.

Leczenie hipercholesterolemii:

Zalecana dawka początkowa powinna wynosić od 5 mg lub 10 mg raz na dobę zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni

statynami, jak również u leczonych innym inhibitorem reduktazy HMG-CoA. Jeśli to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym:

W zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych należy stosować dawkę 20 mg na dobę.

Leczenie dzieci i młodzieży powinien prowadzić lekarz specjalista.

Stosowanie produktu u dzieci i młodzieży należy skonsultować z lekarzem i to on ustali dawkę jaką należy przyjmować.

Działanie:

Rozuwastatyna składnik leku Suvardio działa przede wszystkim w wątrobie, narządzie docelowym dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu. Zwiększa ona ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL oraz hamuje wytwarzanie VLDL w wątrobie, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej ilości cząstek VLDL i LDL.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 20 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej rozuwastatyny.

Przeciwwskazania:

Jeżeli u pacjentów występują któreś z poniższych dolegliwości nie należy stosować u nich leku Suvardio:

- u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnionym, trwałym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy i aktywnością jednej z nich,
- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,
- u pacjentów z miopatią,
- u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną,
- w okresie ciąży, karmienia piersią i u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować działania niepożądane, jednakże nie są one uciążliwe dla funkcjonowania organizmu i szybko przemijają.

Niektóre z zaburzeń jakie mogą występować podczas stosowania leku:

Zaburzenia endokrynologiczne:

- cukrzyca,

Zaburzenia układu nerwowego:

- ból głowy,
- zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit:

- zaparcie,
- nudności,

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- świąd,
- wysypka,
- pokrzywka,

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

- bóle mięśniowe,

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

- astenia,

Więcej informacji na temat działań niepożądanych można odnaleźć w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.