

Sylimarol 70 mg 30 drażetek



Nasza cena: 16,74 zł

Opis słownikowy

Dawka	70MG
Opakowanie	*30
Postać	DRAZ.
Producent	HERBAPOL-POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SILYBUM MARIANUM

Opis produktu

Opis

Sylimarol 70 mg 30 drażetek

Lek Syllimarol 70mg stosuje się w rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz po spożyciu trudno strawnych pokarmów. Wspomagająco w zaburzeniach czynności i przewlekłych stanach zapalnych wątroby.

Dawkowanie - Syllimarol 70 mg 30 drażetek

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 1 tabletkę po jedzeniu o ile lekarz nie zleci inaczej. Produkt wymaga systematycznego stosowania od okresu 4-tygodniowego w przypadku zatruc do kuracji 6-miesięcznej w przypadkach chronicznych. Po konsultacji z lekarzem i po poważniejszych zatruciach można zwiększyć dawkę do 5 tabletek dziennie. Minimalna dzienna dawka wynosi 200mg natomiast maksymalna 400mg.

Skład Syllimarol 70 mg 30 drażetek

- substancje czynne: Silybi mariani fructus extractum DER20-34:1; ekstrahent: metanol 90%;
- substancja pomocnicza: benzoesan sodu <0,2%;
- substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, glukoza, sacharoza, magnezu stearynian, talk, guma arabska, mieszanka wosku pszczelego białego i wosku Carnuba.

Działanie

Sylimaryna stabilizuje błony komórek wątrobowych, chroniących przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych.

Wskazania - Sylimarol 70 mg 30 drażetek

Stany rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi oraz po spożyciu trudno strawnych pokarmów. Wspomagająco w zaburzeniach czynności i przewlekłych stanach zapalnych wątroby.

Przeciwwskazania - Sylimarol 70 mg 30 drażetek

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub nadwrażliwość na rośliny z rodziny Compositae.

Stosowanie u dzieci: Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia.

Ciąża: Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży.

Karmienie piersią: Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią.

Możliwe działania nieporządane - Sylimarol 70 mg 30 drażetek

Nie odnotowano. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia łagodnego działania przeczyszczającego.

Uwagi

Należy zachować szczególną ostrożność: W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (zażółcenia skóry, zabarwienia na żółto białek oczu) należy zasięgnąć porady lekarza. Lek nie nadaje się do leczenia ostrych zatruc.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.