

Syrop tymiankowy złożony, 125g



Nasza cena: 7,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125g
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM HERBARUM

Opis produktu

Opis

Syrop tymiankowy złożony stosuje się tradycyjnie jako lek wykrztuśny w kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie - Syrop tymiankowy złożony, 125g

Doustnie: dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 2 łyżeczki (10 ml) syropu, dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml).

Należy przyjmować dużą ilość płynów, aby umożliwić wywołanie prawidłowego odruchu wykrztuśnego i nie powodować podrażnienia układu oddechowego.

Składniki - Syrop tymiankowy złożony, 125g

100g syropu zawiera:

Substancje czynne: Thymi extractum fluidum (Wyciąg tymiankowy płynny) 15,00g Thymolum (Tymol) 0,01g

Substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy, etanol, syrop zwykły (sacharoza i woda oczyszczona).

Lek zawiera do 5% etanolu.

Działania

Preparat wzmaga wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych i ułatwia odkrztuszanie. Działa bakteriobójczo i przeciwskurczowo.

Przeciwwskazania - Syrop tymiankowy złożony, 125g

Nie należy stosować syropu, jeśli w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na tymianek lub inne rośliny z rodziny Jasnotowate (Lamiaceae/Labiatae) lub którykolwiek ze składników leku.

Również nie stosować w astmie oraz u dzieci z ostrymi stanami zapalnymi krtani i tchawicy w wywiadzie.

W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, duszności lub ropnej płwociny, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawka jednorazowa syropu (10 ml) zawiera do 0,64g etanolu. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową, chorobami wątroby lub padaczką.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Lek zawiera sacharozę. Pacjenci u których stwierdzono wcześniej nietolerancję na niektóre cukry, przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza.

Przeciwwskazania - Syrop tymiankowy złożony, 125g

Po zastosowaniu syropu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości oraz łagodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

Uwagi

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią: syropu nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: lek jest uważany za bezpieczny i w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej oraz zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.