

Tabex 1,5 mg 100 tabletek powlekanych



Nasza cena: 80,43 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5MG
Opakowanie	*100
Postać	Tabletki
Producent	SOPHARMA WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CYTISINUM

Opis produktu

Opis

Tabex 1,5 mg 100 tabletek powlekanych

Preparat stosuje się doustnie w celu odzwyczajenia od używania nikotyny.

Dawkowanie - Tabex, tabletki powlekane, 1,5 mg, 100 szt

Kurację należy rozpocząć od przyjmowania preparatu TABEX doustnie, w ciągu 3 pierwszych dni, po 1 tabletkę co 2 godziny (6 tabletek dziennie), stopniowo zmniejszając liczbę wypalanych papierosów.

- Od 4 do 12 dnia należy przyjmować po 1 tabletkę co 2 i pół godziny (5 tabletek dziennie).
- Od 13 do 16 dnia należy przyjmować po 1 tabletkę co 3 godziny (4 tabletki dziennie).
- Od 17 do 20 dnia należy przyjmować po 1 tabletkę co 5 godzin (3 tabletki dziennie).
- Od 21 do 25 dnia należy przyjmować 1-2 tabletki dziennie.

Osoba paląca powinna definitywnie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.

Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie powinna pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanych wyników terapii. Terapię można powtórzyć po 4-5 miesiącach

Składniki - Tabex, tabletki powlekane, 1,5 mg, 100 szt

substancja czynna: cytyzyna 1,5 mg

substancja pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokryształiczna, talk, stearynian magnezu do 100 mg.

Skład otoczki:

hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek, polietylenoglikol 3000, tracetyna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Działania

Substancją czynną preparatu TABEX, jest alkaloid cytozyny (występujący m.in. w nasionach złotokapu Laburnum), wywierający działanie na receptory N-cholinergiczne (nikotynowe). Cytyzyna pobudza, a następnie poraża zwoje wegetatywne układu nerwowego oraz powoduje na zasadzie odruchu stymulację oddychania: powoduje też wydzielanie adrenaliny z części rdzeniowej nadnercza i wzrost ciśnienia krwi. Działanie cytozyny jest podobne do nikotyny.

Cytyzyna jest wchłonięta z preparatu TABEX, ze względu na podobny mechanizm działania stopniowo wypiera nikotynę, konkurując z nią o te same receptory.

Pozwala to na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie się od palenia tytoniu bez objawów abstynencji. U palaczy stosujących preparat TABEX stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie na nikotynę co pozwala zmniejszyć liczbę wypalanych papierosów.

Należy podkreślić, że osiągnięcie wyleczenia wymaga od osoby palącej silnej woli pozbycia się nałogu palenie tytoniu!

Przeciwwskazania - Tabex, tabletki powlekane, 1,5 mg, 100 szt

Pacjenci z chorobą wrzodowa powinni zachować szczególną ostrożność.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Możliwe działania nieporządane - Tabex, tabletki powlekane, 1,5 mg, 100 szt

U niektórych pacjentów przyjmujących wyższe dawki preparatu mogą wystąpić nudności, wymioty, zawroty głowy, skurcze i osłabienia mięśni. Po obniżeniu dawki objawy znikają.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.