

# Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 60 tabletek

Nasza cena: 31,00 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Producent	LABOFARM STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

## Opis produktu

### Opis

Ziołowe tabletki przeciw niestrawności - Labofarm.

### Dawkowanie - Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 60 tabletek

Dawka jednorazowa dla osób dorosłych to 2-3 tabletki, które można przyjmować do 3 razy dziennie. Osoby w wieku podeszłym i młodzieży: jednorazowo 1-2 tabletki do 3 razy dziennie. Tabletki przyjmować po posiłku, popijając wodą.

### Składniki - Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 60 tabletek

- rafinowany i standaryzowany wyciąg suchy z ostropestu - 7 mg
- korzeń mniszka - 100 mg
- owoc kminku - 50 mg
- liść mięty - 60 mg
- kora kruszyny - 60 mg

### Wskazania - Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 60 tabletek

Preparat tradycyjnie stosuje się w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

### Przeciwwskazania - Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 60 tabletek

Nie należy stosować tabletek przeciw niestrawności Labofarm, jeśli występuje nadwrażliwość na korę kruszyny lub związki antranoidowe, a także w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować również w

przypadku niedrożności jelit lub dróg żółciowych, bólów brzucha o nieustalonej etiologii, ostrych schorzeń zapalnych jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego.

### Przeciwwskazania - Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 60 tabletek

Dotychczas nie odnotowano. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

### Uwagi

- Z uwagi na brak danych możliwość stosowania w okresie ciąży należy skonsultować z lekarzem.
- Z uwagi na możliwość przechodzenia niektórych składników do mleka, stosowanie w okresie karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**