

Tabletki przeciw niestrawności Labofarm, 90 tabletek

Nasza cena: 37,04 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*90
Producent	LABOFARM STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Skład:

- korzeń mniszka lekarskiego (*Taraxaci officinalis radix*) - 100 mg,
- owoc kminku (*Carvi fructus*) - 50 mg,
- liść mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folium*) - 60 mg,
- kora kruszyny (*Frangulae cortex*) - 60 mg,
- wyciąg oczyszczony i standaryzowany z owoców ostropestu o zawartości 58%±10% sylimaryny w przeliczeniu na sylibinę (ekstrahent: aceton 95%) (*Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum*) - 7 mg

Substancje pomocnicze:

Skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jedna tabletką zawiera:

3,8 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, takimi jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na korę kruszyny lub związki antranoidowe, korzeń mniszka lub inne rośliny rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae), a także w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z pozostałych składników leku, niedrożności, zwężenia lub atonii (zastoju) jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego, schorzeń zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bólów brzucha o nieustalanej etiologii, stanu odwodnienia połączonego z utratą elektrolitów niedrożności lub zwężenia dróg żółciowych, chorób wątroby, kamicy żółciowej, czynnej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, innych chorób dróg żółciowych..

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.