

# Tamispras 0,4 mg 30 tabletek

Nasza cena: 8,33 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,4 MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.O PRZEDL.UWALN.
Producent	APOTEX EUROPE B.V. HOLANDIA [NL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TAMSULOSINUM

## Opis produktu

### Opis

## Tamispras 0,4 mg 30 tabletek

### Wskazania - Tamispras 0,4 mg 30 tabletek

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. BPH).

### Dawkowanie - Tamispras 0,4 mg 30 tabletek

1 tabletkę na dobę. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami nerek. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tamsulosyny u dzieci i młodzieży. Brak jest wskazań do stosowania tamsulosyny w tej grupie pacjentów.

### Działanie

Tamsulosyna wiąże się wybiórczo i kompetycyjnie z postsynaptycznymi receptorami  $\alpha$ 1-adrenergicznymi, szczególnie z podtypami  $\alpha$ 1A oraz  $\alpha$ 1D. Prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej.

### Skład

1 tabletkę o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodoru, co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.

### Przeciwwskazania - Tamispras 0,4 mg 30 tabletek

Nadwrażliwość na substancję czynną (w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie. Ciężka niewydolność wątroby.

## Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych należą zaburzenia układu nerwowego: (często) zawroty głowy; (niezbyt często) ból głowy; (rzadko) omdlenia.

Zestawienie wszystkich zaobserwowanych działań niepożądanych znajduje się w ulotce.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.