

# Tanakan, 40 mg, tabletki powlekane, 30 szt (import równoległy)



Nasza cena: 20,14 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	GINKGO BILOBA

## Opis produktu

### Opis

#### Dawkowanie - Tanakan, 40 mg, tabletki powlekane, 30 szt (import równoległy)

3 tabletki na dobę w dawkach podzielonych. Przyjmować doustnie w trakcie posiłków, popijając 1/2 szklanki wody.

#### Składniki - Tanakan, 40 mg, tabletki powlekane, 30 szt (import równoległy)

Substancja czynna: Ginkgo folii extractum siccum DER 35-67:1 o zawartości 21 6-26,4% glikozydów flawonowych, 2,8-3,4% ginkgolidów A,B i C oraz 2,6-3,2% bilobalidu Ekstrahent: aceton 60%(v/v)

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, hypromelozę, macrogol 400(glikol polioksyetylenowy),macrogol 6000(glikol polioksyetylenowy), tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony.

#### Wskazania - Tanakan, 40 mg, tabletki powlekane, 30 szt (import równoległy)

Lek Tanakan jest stosowany:

- w celu zmniejszenia objawów zaburzeń funkcji poznawczych i neurologicznych związanych z wiekiem, jak pogorszenie pamięci (z wyjątkiem poważnych stanów otępiennych jak choroba Alzheimera) oraz w leczeniu objawów pogorszenia krążenia mózgowego w starszym wieku, jak zmniejszenie ostrości wzroku, słuchu )z objawami szumów usznych);
- pomocniczo w celu poprawienia krążenia obwodowego, np. u pacjentów z objawami skrócenia zasięgu chodzenia (tzw. chromania przestankowa) w skutek pogorszenia krążenia w kończynach także u pacjentów z objawami zespołu Raynauda (uczucia marnięcia rąk).

#### Przeciwwskazania - Tanakan, 40 mg, tabletki powlekane, 30 szt (import równoległy)

- Alergia na którykolwiek ze składników tabletki.
- Dla osób z wrodzoną galaktozemią, z zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, bądź też niedoborem laktazy.

## Przeciwwskazania - Tanakan, 40 mg, tabletki powlekane, 30 szt (import równoległy)

Pacjenci ze skłonnością do krwawień powinni zachować szczególną ostrożność przez zastosowaniem leku oraz/lub zasięgnąć porady. Preparat może wydłużyć czas krwawienia.

Rzadko występują: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia skórne, bóle głowy.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**