

# Tantum Verde aerozol, 30 ml



Nasza cena: 21,21 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Postać	AEROSOL DOUSTNY
Producent	Delfarma Sp. Z O.o.
Rejestracja	Lek bez recepty

## Opis produktu

### Opis

Preparat Tantum Verde stosuje się do leczenia objawów związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie:

Lek należy stosować 2 do 6 razy dziennie na dobę, po 2-4 dawki. Każda dawka zawiera 0,17 ml roztworu.

Składniki:

1 ml roztworu zawiera substancję czynną 3 mg benzydaminę chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodorniony, sacharyna sodowa, parahydroksybenzoesan metylu, aromat miętowy, woda oczyszczona.

Działanie:

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, miejscowo znieczulające, odkażające.

Wskazania:

Preparat stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Jak każdy lek, Tantum Verde Forte może powodować działania niepożądane.

Bezpośredni po zastosowaniu preparatu może wystąpić drętwienie lub uczucie kłucia w jamie ustnej i gardle. Reakcja ta jest związana z prawidłowym działaniem leku i ustępuje po krótkim czasie.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: lekkie pieczenie błony śluzowej, nudności i wymioty. Objawy te ustępują samoistnie po odstawieniu leku.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Tantum Verde Forte mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Uwagi:

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Stosowanie innych leków:

W razie stosowania innych leków należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**