

Tantum Verde Forte, aerozol do stos. w j. ustnej i g. 3 mg/ml, 15 ml



Nasza cena: 27,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Postać	AEROZOL
Producent	AZIENDE CHIM.RIUNITE ANGEL.FRANCESCO WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZYDAMINUM

Opis produktu

Opis

Tantum Verde Forte, aerozol do stos. w j. ustnej i g. 3 mg/ml, 15 ml

Preparat stosuje się do leczenia objawów związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie

Lek należy stosować 2 do 6 razy dziennie na dobę, po 2-4 dawki. Każda dawka zawiera 0,17 ml roztworu.

Skład

1 ml roztworu zawiera substancję czynną 3 mg benzydaminii chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodorniony, sacharyna sodowa, parahydroksybenzoesan metylu, aromat miętowy, woda oczyszczona.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, miejscowo znieczulające, odkażające.

Wskazania

Preparat stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach w

laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Jak każdy lek, Tantum Verde Forte może powodować działania niepożądane.

Bezpośredni po zastosowaniu preparatu może wystąpić drętwienie lub uczucie kłucia w jamie ustnej i gardle. Reakcja ta jest związana z prawidłowym działaniem leku i ustępuje po krótkim czasie.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: lekkie pieczenie błony śluzowej, nudności i wymioty. Objawy te ustępują samoistnie po odstawieniu leku.

U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Tantum Verde Forte mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Stosowanie innych leków:

W razie stosowania innych leków należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.