

Tantum Verde roztwór do płukania gardła 120 ml (import równoleły)

Nasza cena: 18,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	120ml
Postać	ROZT.D/PLUK.GARDLA
Producent	Inpharm Sp. Z O. O.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

tantum Verde to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany miejscowo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Skład i działanie:

Substancją czynną preparatu jest benzydamina, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Benzydamina, w przeciwieństwie do innych NLPZ, nie hamuje aktywności cyklooksygenazy ani lipooksygenazy (enzymów biorących udział w przemianach lipidów błon komórkowych prowadzących do powstania prostaglandyn lub leukotrienów) i nie powoduje owrzodzeń przewodu pokarmowego. Benzydamina działa miejscowo przeciwzapalnie wywierając ochronny wpływ na naczynia. Ogranicza powstawanie zmian w naczyniach wywołanych przez pobudzone leukocyty, hamuje degranulację i agregację leukocytów. Benzydamina działa także przeciwobrzękowo zmniejszając przepuszczalność włosowatych naczyń krwionośnych. Ponadto wykazuje działanie odkażające (działa na liczne gatunki bakterii i grzybów) oraz miejscowo znieczulające i przeciwbólowe. Zmniejsza odczuwanie bólu towarzyszącego stanom zapalnym. Preparat stosowany jest miejscowo w leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Po zastosowaniu miejscowym benzydamina dobrze się wchłania, osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Natomiast w minimalnym stopniu wchłania się do krążenia i praktycznie nie wykazuje działania ogólnego.

Wskazanie:

Preparat wskazany w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w stomatologii i laryngologii, a także po intubacji.

Dawkowanie:

Preparat w postaci płynu do płukania jamy ustnej i gardła:

Jednorazowo należy zastosować ok. 15 ml (1 łyżka stołowa) preparatu nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną oraz gardło przez 20–30 s. Stosować 2–3 razy na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 7 dni. Nie zaleca się stosowania roztworu u osób, które mają trudności z prawidłowym płukaniem jamy ustnej i gardła.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.