

Telfexo 120 mg, 20 tabletek powlekanych

Nasza cena: 21,31 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,12 G
Opakowanie	*20
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	FEXOFENADINUM

Opis produktu

Opis

Telfexo 120 mg, 20 tabletek powlekanych

Wskazania

Produkt jest wskazany do łagodzenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Lek jest skierowany do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia. Nie zaleca się stosowania produktu przez młodsze dzieci.

Zaleca się stosowanie 1 tabletki na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia. Chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej.

Działanie

Lek wykazuje działanie przeciwhistaminowym

Skład

1 tabletki powlekana zawiera 120 mg chlorowodoru, co odpowiada 112 mg lub 168 mg feksofenadyny.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeżeli u któregokolwiek z pacjentów wystąpiła nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku należą:

- bóle głowy,
- senność,
- zawroty głowy,
- nudności,
- suchość w jamie ustnej,
- bezsenność,
- nerwowość,
- zaburzenia snu lub koszmary senne/nieprawidłowe sny,
- tachykardia,
- palpacje,
- biegunka,
- wysypka,
- pokrzywka,
- świąd.

Działania niepożądane nie muszą występować u wszystkich pacjentów, nie zawsze również objawiają się w ten sam sposób. Jeżeli u pacjenta zostaną zaobserwowane którekolwiek z powyższych dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.