

# Telmizek 80 mg 28 tabletek

Nasza cena: 17,81 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,08 G
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	ADAMED SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	TELMISARTANUM

## Opis produktu

### Opis

## Telmizek 80 mg 28 tabletek

### Wskazania

Lek jest zalecany do stosowania podczas :

- nadciśnienie tętnicze
- zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
- zmniejszenie częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną
- chorobą miażdżycową (choroba niedokrwienności serca, udar mózgu lub choroba tętnic obwodowych w wywiadzie) lub cukrzycą typu 2

### Dawkowanie

Lek stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego : skuteczna dawka wynosi 40 mg raz/dobę. U niektórych chorych poprawa może nastąpić już po dawce 20 mg przy czym maksymalne działanie obniżające ciśnienie jest osiągnięte po 4- 8 tygodniach .od rozpoczęcia leczenia.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: zalecana dawka to 80 mg raz/dobę.

Zaburzenia czynności nerek: u pacjentów tych zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 20 mg. Zaburzenia czynności wątroby: w przypadku łagodnych do umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby, dawka nie powinna być większa niż 40 mg raz/dobę.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Nie zaleca się stosowania telmisartanu u pacjentów poniżej 18 -go roku życia.

### Działanie

Telmisartan hamuje zwiększenie ciśnienia tętniczego, obniża ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi. Nie wpływa na częstość akcji serca.

## Skład

1 tabletkę zawiera 80 mg telmisartanu.

## Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną telmisartan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Ciąża II i III trymestr.

Dodatkowo nie należy stosować leku gdy wystąpiły : zaburzenia w odpływie żółci, ciężka niewydolność wątroby.

## Działania niepożądane

Podczas stosowania leku mogą pojawić się działania niepożądane takie jak : zakażenie górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie gardła i zapalenie zatok, zakażenia układu moczowego, w tym zapalenie pęcherza moczowego. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych. Zwiększone stężenie kreatyniny w osoczu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łączne.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.