

Terbiderm krem 10 mg/g, 15 g



Nasza cena: 17,20 zł

Opis słownikowy

Dawka	10MG/G
Opakowanie	15 g tuba
Postać	KREM
Producent	GEDEON RICHTER LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TERBINAFINUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w zakażeniach skóry wywołane przez niektóre drożdżaki, głównie z rodzaju Candida.

Dawkowanie - Terbiderm krem 10 mg/g, 15 g

Wyłącznie do stosowania na skórę.

Lek należy stosować raz lub dwa razy na dobę. Przed nałożeniem leku, skórę ze zmianami chorobowymi należy najpierw dokładnie oczyścić i wysuszyć. Następnie na obszar zmian chorobowych oraz wokół nich, należy nałożyć cienką warstwę leku i delikatnie wcierać go w skórę.

Składniki - Terbiderm krem 10 mg/g, 15 g

Skład (1gram): 10 mg chlorowodoru terbinafiny oraz substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, alkohol benzylowy, stearynian sorbitanu, palmitynian cetylu, alkohol cetylowy, alkohol cetylostearylowy, Polisorbat 60, mirystynian izopropylu, woda oczyszczona.

Działania

Substancja czynna leku – terbinafina – ma działanie grzybobójcze na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne. Ma także zależnie od gatunku, działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne na drożdżaki.

Grzybica międzypalcowa stóp, zwana inaczej stopą atlety, może występować zarówno na jednej, jak i na obu stopach. Najczęściej rozpoczyna się pomiędzy V i IV oraz III i IV palcem, może również występować na wewnętrznej powierzchni stopy tzw. podbiciu. Skóra pęka, łuszczy się, jest zaczerwieniona, czasem swędzi. Dolegliwość tę powinno się leczyć jak najszybciej po zauważeniu pierwszych objawów.

Wskazania - Terbiderm krem 10 mg/g, 15 g

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica skóry gładkiej, fałdów skórnych tułowia i pachwin) łupież pstry.

Przeciwwskazania - Terbiderm krem 10 mg/g, 15 g

Nie stosować leku jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek składnik leku.

Przeciwwskazania - Terbiderm krem 10 mg/g, 15 g

Sporadycznie w miejscu zastosowania leku może wystąpić lekkie zaczerwienienie, pieczenie, świąd. Tych objawów nie należy mylić z reakcjami uczulenia (wystąpienie obrzęku, bólu, wysypki w miejscu stosowania), które rzadko, lecz jeśli wystąpią- należy zaprzestać stosowania leku.

Uwagi

Ciąża:
W okresie ciąży lek można stosować tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią:
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż terbinafina przenika do mleka matki.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.