

Terbilum, krem 15 g



Nasza cena: 9,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15g
Postać	KREM
Producent	Oceanic S.A.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Terbilum to lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego.

Skład i działanie substancji:

Substancją czynną preparatu jest terbinafina, pochodna alliloaminy o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczna wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, a także drożdżaków i niektórych innych grzybów chorobotwórczych. Działanie terbinafiny, podobnie jak leków przeciwgrzybiczych z grupy pochodnych imidazolu i triazolu, prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórek grzyba. Po podaniu miejscowym na skórę terbinafina osiąga duże stężenie w warstwie rogowej naskórka. Wchłanianie do krwi jest znikome i w związku z tym, działanie ogólnoustrojowe jest niewielkie.

Wskazania:

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, takich jak:

- grzybica stóp
- grzybica fałdów skórnych (np. w pachwinach, pod piersiami, w obrębie pach, na wewnętrznej powierzchni ud)
- grzybica skóry gładkiej

oraz w leczeniu zakażeń skóry wywołanych przez drożdżaki, takich jak:

- łupież pstry
- drożdżycza skóry.

Dawkowanie:

Preparat ma postać kremu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Preparat należy stosować na uprzednio umytą i osuszoną skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia:

Niewielką ilość preparatu należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry i leko wetrzeć. Jeżeli preparat stosowany jest na obszar zakażony znajdujący się w fałdach skórnych, powierzchnię, na którą naniesiono preparat należy przykryć gazą (zwłaszcza jeżeli preparat jest stosowany na noc).

Każdorazowo po nałożeniu preparatu należy umyć ręce wodą i mydłem.

W grzybicy stóp (z wyłączeniem grzybicy podeszwy stopy), fałdów skórnych, skóry gładkiej stosować 1 raz na dobę przez 1 tydzień. W łupieżu pstrym krem stosować 1 raz na dobę przez 2 tygodnie. W grzybicy podeszwowej stóp (obejmującej podeszwę i boczne powierzchnie stóp) krem stosować 2 razy na dobę przez 2 tygodnie.

Stosowanie preparatu należy kontynuować przez zalecany okres czasu nawet w przypadku wcześniejszego ustąpienia objawów. Pomoże to zapobiegać nawrotom choroby.

W celu uniknięcia ponownego zakażenia należy przestrzegać zasad higieny osobistej.

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia należy skonsultować się z lekarzem.

Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12. roku życia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.