

Tertens-AM 1,5 mg + 5 mg 30 tabletek

Nasza cena: 20,68 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5MG+5MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Laboratoires Servier Francja [Fr]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	INDAPAMIDUM, AMLODIPINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania - Tertens-AM 1,5 mg + 5 mg 30 tabletek

Leczenie substytucyjne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym, którzy stosują indapamid i amlodypinę w jednakowych dawkach w oddzielnych preparatach.

Dawkowanie - Tertens-AM 1,5 mg + 5 mg 30 tabletek

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Ścisłe według zaleceń lekarza. Przed pierwszym zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.

Działanie

Leczenie zastępcze wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów już przyjmujących indapamid i amlodypinę w oddzielnych tabletkach i tej samej dawce.

Skład

1 tabletkę zawiera 1,5 mg indapamidu oraz 6,935 mg amlodypiny bezyłanu (co odpowiada 5 mg amlodypiny).

Przeciwwskazania - Tertens-AM 1,5 mg + 5 mg 30 tabletek

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, encefalopatia wątrobowa, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, hipokaliemia, laktacja, niedociśnienie tętnicze, wstrząs, w tym również wstrząs kardiogeny, zwężenie zastawki aorty dużego stopnia, niewydolność serca po przebytych zawale serca, zastosowanie leku musi być

bardzo ostrożnie rozważone u pacjentów z dną moczaniową lub cukrzycą.

Działania niepożądane

Hipokaliemia, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenie widzenia, senność, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy, duszności, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień, nudności, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, wysypka, obrzęk okolicy kostek, kurcze mięśni, zmęczenie, bóle: stawów, mięśni, pleców, zaburzenie erekcji.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.