

## Theraflu Extragrip, 10 saszetek



Nasza cena: 29,06 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA SZWAJCARIA [CH]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, PHENYLEPHRINUM, PHENIRAMI

### Opis produktu

#### Opis

### Theraflu Extragrip, 10 saszetek

Theraflu extragrip to lek wieloskładnikowy. Zawiera jako substancje czynne: chlorowodorek fenylefryny zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, paracetamol działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz maleinian feniraminy - substancję antyhistaminową zmniejszającą produkcję śluzowej wydzieliny w nosie. Theraflu Extragrip po rozpuszczeniu w wodzie tworzy gorący, aromatyczny napój.

### Dawkowanie - Theraflu Extragrip, 10 saszetek

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej wody. Przyjmować doustnie w postaci gorącego napoju.

Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek. Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania preparat można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli: objawy chorobowe nie ustąpią w ciągu 5 dni, kaszel utrzymuje się dłużej niż 5 dni, pojawi się wysypka, gorączka lub uporczywy ból głowy; ból gardła z gorączką, bólem głowy, wysypką, nudnościami lub wymiotami utrzymuje się dłużej niż 2 dni.

### Składniki - Theraflu Extragrip, 10 saszetek

1 saszetka zawiera: substancje czynne: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg, substancje pomocnicze: sacharoza, acesulfam potasowy, barwnik D & C Yellow No 10, zółcień pomarańczowa, maltodekstryna M100, krzemionka koloidalna uwodniona, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

## Wskazania - Theraflu Extragrip, 10 saszetek

Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno - stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.

## Przeciwwskazania - Theraflu Extragrip, 10 saszetek

Nie należy stosować leku Theraflu Extragrip w przypadku:

- nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników leku,
- aktualnego stosowania (lub stosowania w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitorów MAO,
- u dzieci poniżej 12 lat,
- stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania,
- współistniejących schorzeń płuc (w tym astmy),
- wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-P).

Przed zastosowaniem leku Theraflu Extragrip należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, chorób tarczycy, cukrzycy i jaskry, chorób nerek i wątroby, padaczki, schorzeń dróg moczowych, czynnej choroby wrzodowej,

lek zawiera paracetamol, który stosowany w wysokich dawkach lub przez zbyt długi czas, powodować może uszkodzenia wątroby, fenylefryna powodować może fałszywie pozytywne wyniki testów dopingowych (informacja szczególnie istotna dla osób uprawiających sport wyczynowo), osoby stosujące lek Theraflu ExtraGRIP nie powinny pić napojów alkoholowych, gdyż paracetamol w połączeniu z alkoholem etylowym może powodować uszkodzenia wątroby, ze względu na naczyniozężyzające działanie fenylefryny lek należy stosować ostrożnie u pacjentów powyżej 70 lat ze schorzeniami układu krwionośnego, lek zawiera 12 g sacharozy, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku powinien się on skontaktować z lekarzem.

## Przeciwwskazania - Theraflu Extragrip, 10 saszetek

Jak każdy lek, lek Theraflu ExtraGRIP może powodować działania niepożądane. Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku obejmują:

- reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, wysypki, napady astmy (zwłaszcza 5-10% populacji osób z nietolerancją kwasu acetylosalicylowego),
- układ pokarmowy - zaparcia, biegunki, wzdęcia, nudności, wymioty, pieczenie w nadbrzuszu, uszkodzenie wątroby, suchość w jamie ustnej i gardle,
- ośrodkowy układ nerwowy: senność, bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, drażliwość, nerwowość. Rzadziej obserwowano śpiączkę, napady padaczki, zaburzenia ruchów dowolnych, zmiany w zachowaniu. Bezsenna i kłopoty ze snem występują rzadziej, dotyczą zwłaszcza dzieci,
- układ krążenia: tachykardia (przyspieszenie czynności serca), kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym), odruchowa bradykardia (zwolnienie czynności serca),
- zmiany w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), niedokrwistość hemolityczna a w pojedynczych przypadkach agranulocytoza (choroba charakteryzująca się znacznym zmniejszeniem liczby krwinek białych i całkowitym lub prawie całkowitym zanikiem granulocytów z krwi, zmianami wrzodziejącymi w gardle i błonach śluzowych innych narządów, gorączką i różnie wyrażonymi objawami ogólnymi),
- układ moczowy: bolesne oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu, utrudnienie mikcji (zwłaszcza u mężczyzn),

-inne: rozszerzenie źrenic spowodowane jaskrą, suchość gałek ocznych, wpływ na funkcje wewnętrzwydzielnicze oraz inne regulujące metabolizm.

## Interakcje

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty. Leku nie należy stosować z innymi lekami o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Należy zasięgnąć opinii lekarza w przypadku równoczesnego stosowania: inhibitorów MAO, leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), kofeiny, chloramfenikolu, probenecydu, leków zwiększających metabolizm wątroby (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina), izoniazydu, indometacyny, leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, metylodopy, rezerpiny, barbituranów, glikozydów naparstnicy, leków przeciwdepresyjnych, alkaloidów sporyszu, doustnych środków antykoncepcyjnych.

## Uwagi

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować u dzieci do 12 lat.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**