

Theraflu Extragrip, 14 saszetek



Nasza cena: 36,28 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*14
Postać	Saszetki
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA SZWAJCARIA [CH]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, PHENYLEPHRINUM, PHENIRAMI

Opis produktu

Opis

Preparat stosuje się w leczeniu objawów grypy i przeziębienia.

Dawkowanie - Theraflu Extragrip, 14 saszetek

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej wody. Przyjmować doustnie w postaci gorącego napoju. Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek.

Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania preparat można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni.

1 saszetka zawiera proszek do sporządzania roztworu doustnego o naturalnym aromacie cytrynowym. Proszek jest rozpuszczalny w gorącej wodzie.

Składniki - Theraflu Extragrip, 14 saszetek

(1 saszetka): paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniramininy 20 mg oraz substancje pomocnicze w tym sacharoza.

Działania

- zmniejsza obrzęk nosa
- przeciwbólowe
- przeciwgorączkowe

Wskazania - Theraflu Extragrip, 14 saszetek

Preparat stosuje się w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina z nosa, kichanie.

Przeciwwskazania - Theraflu Extragrip, 14 saszetek

Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, choroby wątroby i/lub nerek, nadciśnienie tętnicze, przerost gruczołu krokowego, cukrzycę, choroby płuc, jaskrę, padaczkę. Gdy przyjmujesz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki nasenne, przeciwpadaczkowe, uspakajające, doustne leki przeciwzakrzepowe, leki obniżające ciśnienie krwi, glikozydy naparstnicy, alkaloidy sporyszu.

Przeciwwskazania - Theraflu Extragrip, 14 saszetek

Reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypki, napady astmy), zaparcia, biegunki, wzdęcia, nudności, wymioty, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej i gardle, senność, bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, drażliwość, nerwowość, wzrost ciśnienia krwi (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym).

Uwagi

Lek może powodować senność. Podczas stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. Uczucie senności może nasilać się u osób stosujących lek i przyjmujących leki nasenne lub pijących napoje alkoholowe.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.