

## Theraflu Zatoki, 10 saszetek



Nasza cena: 21,03 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	Novartis Consumer Health Sa
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok.

#### Dawkowanie - Theraflu Zatoki, 10 saszetek

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej wody. Przyjmować doustnie w postaci gorącego napoju.

Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek. Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania preparat można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni.

#### Składniki - Theraflu Zatoki, 10 saszetek

(1 saszetka): paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, substancje pomocnicze w tym sacharoza

#### Działania

Theraflu Zatoki po rozpuszczeniu w wodzie tworzy gorący, aromatyczny napój. Udrażnia nos i zatoki. Zmniejsza ból głowy i zatok. Działa przeciwgorączkowo, łagodzi objawy przeziębienia i grypy (dreszcze, bóle mięśni i głowy).

#### Wskazania - Theraflu Zatoki, 10 saszetek

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej.

#### Przeciwwskazania - Theraflu Zatoki, 10 saszetek

Nie należy stosować leku Theraflu Zatoki w przypadku:

- nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników leku,
- aktualnego stosowania (lub stosowania w ciągu ostatnich dwóch tygodni) leków zawierających inhibitory MAO,
- dzieci poniżej 12 lat,
- stosowania innych produktów leczniczych zawierających paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania,
- współistniejących schorzeń płuc (w tym astmy),
- wrodzonego niedoboru dehydrogenazy glukozy - 6 -fosforanowej (G-6-P).

### Przeciwwskazania - Theraflu Zatoki, 10 saszetek

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku obejmują:

- reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, wysypki, napady astmy (zwłaszcza 5 - 10% populacji osób z nietolerancją kwasu acetylosalicylowego),
- układ pokarmowy: zaparcia, biegunki, wzdęcia, nudności, wymioty, pieczenie w nadbrzuszu, uszkodzenie wątroby, suchość w jamie ustnej i gardle,
- ośrodkowy układ nerwowy: senność, bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, drażliwość, nerwowość. Bezsenność i kłopoty ze snem występują rzadziej, dotyczą zwłaszcza dzieci,
- układ krążenia: tachykardia (przyspieszenie pracy serca), kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym), odruchowa bradykardia (zwolnienie czynności serca),
- zmiany w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), niedokrwistość hemolityczna a w pojedynczych przypadkach agranulocytoza (choroba charakteryzująca się znacznym zmniejszeniem liczby krwinek białych i całkowitym lub prawie całkowitym zanikiem granulocytów z krwi, zmianami wrzodziejącymi w gardle i błonach śluzowych innych narządów, gorączką i różnie wyrażonymi objawami ogólnymi),
- układ moczowy: bolesne oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu, utrudnienie mikcji (zwłaszcza u mężczyzn)
- inne: rozszerzenie źrenic spowodowane jaskrą, wpływ na funkcje wewnątrzwydzielnicze oraz inne regulujące metabolizm.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**